


外臺秘要

[H] Chinese

10

Vol X v.26-428







唐王燾先生外臺秘要方卷二十六目錄

痔病陰病九蟲等三十五門

五痔方一十二首

五痔數年不差方六首

五痔脫肛方二首

腸痔方一十五首

諸痔方二十八首

痔下部如蟲齧方九首

大便秘下血風冷積年變作痔方三首

灸痔方二首

雜療痔方五首

脫肛方三首

肛門凸出方三首

卒大便秘脫肛方六首

腸肛俱出方二首

脫肛歷年不愈方三首

疝氣及癰方六首

卒病癰方五首

癰卵偏大方三首

灸諸癰方一十四首

陰腫方六首

陰疝腫縮方一首

陰卒腫痛方三首

陰囊腫痛方五首

陰下癢濕方七首

陰痛方三首

陰瘡方七首

陰邊粟瘡方五首

著硃砂方四首

九蟲方一首

五臟蟲方七首

長蟲方二首

蛔蟲方九首

寸白蟲方一十九首

蛭蟲方六首

三蟲方六首

雜療蟲方三首

尚德按方疑當作法

尚德按方疑當作硃

尚德按方疑當作七







唐王壽先生外臺秘要方卷二十六

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進  
新安後學程衍道敬通父訂梓

五痔方一十二首

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外時時膿血出者名壯痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也若肛邊有核痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出者名血痔也若大便難肛良久肯入者名氣痔也此皆坐中寒濕或房室失節或醉飽過度所得當時不為患久久不差終能困人別有大方令單行亦要便宜依按用之

肘後集驗同出第四卷中

廣濟療五痔方 生槐煎疳皂角二兩灸麝香研鰻鱧魚炙雄黃研茛菪熟丁香 木香各二 右八味

搗篩以槐煎和丸分為五丸取一淨瓶可一升以來極地埋之著一壘子於瓶上鑄壘子作孔內火瓶中灰蓋之然後內藥一丸燒以下部著壘孔上坐便通汗其盡一丸藥即止內痔以藥一丸內下部立效仍不及薰忌魚熱麪等

又療五痔蝟皮散方 蝟皮炙龜甲炙當歸各六黃耆 槐子 大黃各八蛇皮炙五露路房各五藁本

桂心各五猪後懸蹄甲枚十四 右十一味搗為散空腹以米飲服方寸匕日二漸加一匕半不利忌如

前方

又療五痔下血不止方 槐子 五色龍骨 柳葉炙乾薑 芎藭 當歸 茜根 吳茱萸各六白

欬 附子五分黃耆八分猪懸蹄甲枚十四髮灰四分 右十四味搗篩蜜丸空腹以飲服如梧子二

十九日二漸加至四十九若利恐多意減之忌如前方

出第四卷中

小品療五痔散主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居血縱橫出方 赤小豆四分黃耆二分附子炮白欬

桂心各一芍藥 黃芩各二 右七味搗為散以酒服方寸匕日三止血大驗文仲同備

外臺秘要

卷二十六

五痔方一十二首

如前方三  
字宋本作  
魚葱蒜七  
字  
如前方三  
字宋本作  
生冷灸肉  
猪魚蒜七  
字  
出字下宋

燒字下宋  
本有之字



本有及肉二字

丸療下宋本有久字

尚德按肚疑當作肝

同字下宋本有禁生

本有燒字

徐安以下八字本宋大書

尚德按千金三指上

有方字一

生作消

又方 藜蘆 大黃 黃連各半 練木子十四枚 桃仁十四枚 巴豆四枚 去草麻十四枚 右七味咀

以豬肪一升煎三沸下去滓傳賢肉上日三外著此膏內服紫參丸常併行驗同

又療五痔大便肛邊清血出紫參丸療不差服之無不差方 紫參 秦光 亂髮灰 紫苑 厚朴已

上略藥本兩雷九升白芷兩盧蠱半兩貫衆三兩猪後懸蹄甲十四枚蟲半兩石南半兩右十三

味搗篩以羊脊骨中髓合猪脂各半升煎和丸如梧子末食酒服十五九日再亦可飲下劇者夜一服

四日肛邊痒止八日膿血盡鼠乳悉愈滿六十日終身不復發久服益善有痔病十八年肛出長三寸

服此方即愈亦療脫肛有人熱可除羊髓以赤蜜代集驗備急

集驗療五痔有氣痔溫寒濕勞即發蛇蛻皮主之壯痔生肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣翫甲主之

批痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血蛻皮主之腸痔更衣挺出久乃縮壯猪左懸蹄甲主之腸痔更

衣出清血蜂房主之方 右所主藥皆下篩等分隨病倍其所主藥為三分旦早以井花水服方寸匕病

甚者旦暮服之亦可至四五服唯得食乾白肉病差之後百日乃近房室又用藥內下部有瘡內中無

瘡內孔中千金同

又方 野葛木 右一味以刀圭內藥中服五日知二十日差三十日愈徐安用之

又方 煮槐根洗之又煮桃根洗之千金備急同並

刪繁療五痔桃葉蒸痔方 桃葉解細糠 胡麻各一 右三味合為一家蒸之取細糠熟為度內小口

變中將肛門坐桃葉氣熏入肛門蟲出當死出第十

千金療五痔方 蛻皮三指熏黃如棗熟艾握 右三味穿地作坑調和取便重之取口中熏黃烟氣出

為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹饌將補慎雞鵠魚生冷

又方 桑耳 右一味作羹空腹之飢飽食之三日食之待孔卒痛如鳥喙取大豆小豆各一升合搗作

兩囊中蒸之及熱更互坐之即差並出第二



本有二十日內補之

六字

尚德按千

金大小豆

藥法別為

一方家作

家升作斗

作內一

宋本無一

名概子四

尚德按十

金同千金

翼無白飲

止十五未

尚德按千

金酒服

尚德按千

金無概白

皮止三味

五痔數年不差方六首

深師療五痔數年不差槐子丸主燥濕痔痔有雌雄為病若暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩痒者三五年皆殺人忌飲酒及作勞色犯之即發方 槐子 乾漆 熬 槲木根皮 各四兩

子即秦光 黃荅 白斂 青木香 牡蠣 熬 龍骨 附子 炮 雷丸 蒺藜子 白芷 桂心 雞

舌香 各二 黃耆 配 右十六味 搗篩蜜和為丸 一服二十九日 三服 千金 翼同 千金 翼有丁香 菜

千金小槐實丸主五痔十年方 槐子 龍骨 十 礬石 燒 硫黃 各一 白糖 仁 大黃 十 乾漆 十 兩 右七味

搗篩石二種及糖並細切內銅器中一石米下蒸之以絲絞取汁以和藥合作丸併手捻之丸如梧子

大陰乾一服二十九日三服 同 深師

又槐酒主五痔五十年不差方 槐東南枝 細切 槐東南根 細切 槐白皮 剉 一 槐子 一 右四味大釜以

水十六石煮取五石澄取清更煎取一石六斗以兩石黍米上麴二斗釀之攪令調封泥七日酒熟取

清飲日三四適寒溫量性常令小小醉耳合時更煮滓取汁搗米洗器不得用生水此藥忌生水故也

深師並 翼同

又方 塗熊膽取差方止但發即塗一切方皆不及此 救急并翼同並出 第二十四卷中

古今錄驗療三十年痔肛出下血如雞肝此腸痔肛邊生瘰癧肛中此壯痔肛邊生乳此乳痔皆飽勞氣

所生方 大黃 如金色 十兩 滑石 碎 兩 芒硝 兩 桑白皮 兩 棗 三十 黃芩 兩 杏仁 研 右七味切以酒一斗二

升煮取二升盡服之當下

又療十年痔如鼠乳膿出便作血劇白斂散方 赤小豆 炒 黃耆 各 芍藥 各 白斂 仁 黃芩 各 桂心 各 附子

炮 牡蠣 各 二 右八味搗篩為散酒若泔汁服方寸匕日三服 並出第三 十卷中

五痔脫肛方二首 千金療五痔脫肛槐皮膏止痛痒血出方 槐白皮 兩 薰草 辛夷 甘草 白芷 各 半 野葛 各 巴豆 各

五痔數年不差方六首 五痔脫肛方二首



尚德按六  
枚于金作  
十枚宋本  
作七枚  
中下宋  
本有黃草  
肝後作黃  
尚德按錄  
字下疑脫  
驗字下宋  
發字下宋  
本有忌粘  
肉冷水五  
字  
中下宋  
本有崔氏  
用鰾魚五  
字  
尚德按錄  
字下疑脫  
驗字下宋  
病字下宋  
本有至今  
傳將服勿  
止七字

去漆子六桃仁七枚猪脂半斤右十味切以猪脂煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五過蟲死差

止痒痛大佳出第二十卷中

必效五痔脫肛方 以死蛇一枚猪大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板覆坑上坐蟲盡出張文仲處出第六卷中

腸痔方一十五首

肘後療患腸痔每大便常有血方 以蒲黃水服方寸匕日三差備急文仲崔氏千金古今錄同

又方 礬石熬附子地各二兩右二味搗篩蜜丸如梧子服二丸酒下日三稍增古日永差不發備急文仲崔氏千金同

又方 以鯉魚作鱠薑鹽食之任性多少良崔氏用鰾魚

又方 常食鯽魚羹及熬隨意任之備急文仲同並出第三卷中

又仲療腸痔方 以槐木上耳搗末飲服方寸匕日三肘後古今錄千金同

又方 白薔薇根 枸杞根各二分 右二味搗篩為末服方寸匕日三五六日當更小腫是中病崔氏備急

又方 生地黃一斤酒半 右二味以酒漬地黃三日隨意飲多少即差肘後備急同

又方 取枳根皮末飲服方寸匕日三亦可煮汁常飲附後備急崔氏皆同

備急療腸痔方 以穀子燒末敷之深者導之文仲崔氏同

又方 以槐白皮一擔剉水煮令濃脫衣入中坐當如欲大便狀冷更易不過三蟲出

又方 搗槐白皮作屑粉以導之崔氏文仲千金必效同

又方 以礬並燒灰礬石熬和為粉粉之崔氏文仲崔氏同出第六卷中

刪繁療肺虛勞寒損至腸中生痔名曰腸痔肛門邊有核痛寒熱得之好挺出良久乃縮而瘡生猪懸蹄

青龍五生膏方 猪懸蹄甲三枚生梧桐白皮兩生龍膽分生桑白皮分五蛇脫皮分五雄黃分生青竹皮分六

生柏皮七分露蜂房炙蜀椒三分蠟皮 附子四分杏仁去皮 右十三味細切綿裹以苦酒二升



二服下末  
雞酒髮生  
冷魚油膩  
等十一字  
減字下末  
忌麝猪肉  
魚蒜陳臭  
物十一字

大驗下末  
本有忌猪  
肉冷水五  
字

尚德按糯  
千金作糯  
高德捷千  
金無涎字  
庭作宅

浸一宿於火上炙燥搗篩以豬脂三升和微火煎之如薄糖數并酒服如棗核出第七卷中

崔氏療大便後出血此腸痔之疾宜服雞白湯方 雞白切七羊腎脂升右二味緩火煎令雞白黃去滓

頓盡未差更服即止得膿血與糞相和即差

又方 白礬燒汁附子地乾薑略一右三味搗篩蜜和飲服二九至三九日二服並出第四卷中

諸痔方二十八首

廣濟療痔下血方 以蛇不問多少煎煮肉消盡去滓用汁和婆羅粥著少鹽食之大效一無所忌

又黃耆九方 黃耆 枳實炙各烏蛇炙當歸 赤石脂各二兩蝟皮炙二兩右六味搗篩蜜丸空腹酒下

如梧子二十九日二服更不加減並出第四卷中

范汪療痔下血黃連麴散方 黃連二兩右二味搗篩薄蜜漫洗食以飲服五分匕日三不知增至

方寸匕

集驗療痔蝟皮丸方 槐子三兩附子二兩當歸二兩連翹二兩乾地黃五兩乾薑二兩礬石二兩燒續斷 黃耆各一兩蝟皮一具細切 右十味搗篩蜜丸飲服十五丸如梧子日再加至三十九丸亦可主瘰癧常用大驗肘後

蝟皮熱令焦

備急文仲刪繁十

又方 以生槐皮十兩削去黑皮熟搗丸如彈子綿裹內下部中大效備急十

又方 以槐赤雞一斤為散飲服方寸匕槐糯也

千金療痔神方 以七月七日多採槐子熟搗涎取汁重綿絞內銅器中盛庭中高門上暴之二十日以

上煎成取如鼠糞大內穀道中日三亦主瘰癧及百種瘡救急崔氏古

又方 鯉魚腸三具以火炙令香右一味以綿裹內下部中一食頃蟲當出魚腸數數易之盡數枚當差一方

云坐上蟲出驗同

又方 虎頭骨炙犀角 右二味各為末如雞子大以不中水猪脂和塗瘡上即差救急深師同並出第二十四卷中



崔氏療痔方 崔林草粗切 右一味以水二大升煮取一升頓服盡三日重作一劑無不差者

又方 取駱駝頰下毛燒作灰可取半雞子大酒和頓服之 並出第四卷中 必效熨痔法痔頭出或疼痛不可堪忌方 取枳實煨灰中煨之及熟熨病上盡七枚立定發即熨之水

除也

又方 以麝香當門子印成鹽相和以手塗痔頭上若令人著亦佳其痛不可忍者不過兩度永差

又方 以野豬肉炙食十頓即差三方云奇效

又方 取五月五日蒼耳子陰乾搗末水服三方寸七日三差乃止

又方 以二十年久鐵線袋口燒作灰分和水服

又痔正發疼痛方 以葱和鬚濃煮湯置盆中坐浸之須臾即當痛止

又方 以狸肉作羹食之或作輔食之不過三頓無不差

又方 以肥大棗一顆剝去赤皮取水銀掌中以唾研令極熟塗裹臍上內下部中差

又方 以篇蓄根葉搗汁服一升一兩服差

又方 薑屑兩 右一味以水三大合煮之取一合去滓煖空腹服隔日再服忌豬肉蒜等

又方 倚死竹色黑者取之折斷燒為灰篩和薄飲服之方寸匕忌牛肉餘無所忌 出第三卷中

古今錄驗療痔黃耆丸方 是直中言散時常服解立言處 黃耆 青箱子 漏蘆 鼈甲 炙狼牙 各五 黃柏 各四 犀角

屑 分 班貓 起去足 蛻皮 起去足 白礬 起去足 地膽 起去足 蜈蚣 起去足 猪鬃 蹄甲 起去足 右十四味搗

篩為散蜜和丸如梧子大空腹以飲服二九日二樽之以知為度忌一切油膩菹菜

又方 掘地深一尺圓徑四寸炭火燒令赤去火以魚薄著口上取鳧宕子一合內坑中燒烟出痔入坐

上以被擁當汗出蜜室內作之以烟盡更著一合鳧宕子熏避風如發汗法則差

又療諸痔及下血不止轉虛羸者服之無不效方 黃耆 枳實 各二大兩半 黃礬石 一大兩炭火燒經



下有原州  
着三字枳  
實下有商  
州者三字

尚德按有  
異疑當作  
無異

尚德按穀  
中下疑脫  
字

今勻著火冷  
細羅去沙淨

右三味先搗黃耆枳實篩訖然後和礬石更搗勻蜜和丸空腹以酒下二十九加至

二十九日再服忌蕎麥豬肉蒜魚勞事唯久服一年半年愈良驗

又療痔方

鯉魚腸升可半

右一味擇之令淨仍新鮮取一方板可闊一尺以來厚二寸當中鑿孔窠一

寸半圓如醬盞口大布魚腸于其內以好麝香碎末滲魚腸取厚毡二三重當心開孔可板孔大小鋪坐以被擁之數進食可至兩炊久覺下部痛者即是蟲出也時且更坐良久取魚腸細擇之恐蟲入於腸中蟲可長一二寸許細如網絲班作五色每出不過十餘枚不問度數蟲盡則止

許仁則曰此病在內痔有外痔內但便時有血外有異外痔下部有孔每出血從孔中出內痔每便即有血下血甚者下血擊地成孔出血過多身體無復血色有痛者有不痛者有此候者宜依後藥方

子堅一斗時候末

右一味搗令碎絞取汁日暴取稠取地膽暴乾搗篩為散和槐子煎作丸以飲服十九

日再加至三十九如桐子大兼以煎燃作丸如棗核大內下部中日夜三四度亦可搗苦參末代地膽

藥中無地脈惟有地麥十又小字

依前生槐子煎不覺可宜合後黃耆十味散服之方

黃耆五苦參

玄參各六兩

附子炮

大黃各三乾薑

二  
蠟皮  
矣

黃連各兩

槐子

猪鬃蹄甲一具

右藥搗篩為散空腹以飲服方寸匕日再服之漸漸

加至二匕忌猪肉冷水

11

痔下部如蟲齧方九首

肘後療痔下部痒痛如蟲齧方

胡粉

水銀

右二味以棗膏調勻綿裹夜臥內穀中導之效

又方

以兔絲子熬令黃黑末以雞

子黃和塗之

又方

以杏仁熬令黑搗取膏塗之

仲崔氏同

又方

以蠟皮燒灰敷之。又獺肝燒搗散服之。

仲同

又方以溺溫令熱內少礬石以洗之良

第二卷中



文仲療痔下部如蟲齧方 搗桃葉一斛蒸之令熟內小口器中以布蓋上坐之蟲死即差附復崔氏備急同方有

梅烏

又方 掘地作小坑燒令赤以酒沃中搗吳茱萸三升內中及熟以板覆上開一小孔以下部坐上冷乃

下不過三度即差附復崔氏備急同

又方 以小豆一升好苦酒五升煮豆令熟出暴乾復內令酒盡止搗末以酒服方寸匕日三崔氏備急同

又方 以猪椒子一升酒一升經五日稍稍飲一日令盡佳崔氏同出第六卷中

大便下血風冷積年變作痔方三首

崔氏療大便急去血或至一升數合面少血色此是內傷風冷積年多變作痔方 大黃五甘遂三黃芩分

乾薑 附子 各四 桃仁 三 艾 七 白 蘘 右七味以水六升煮取一升半先服半升藥稍安又服半

升須臾血發又服半升未斷候發日再作不過三劑差忌猪肉等

又方 煮桃皮李皮篇蓄苦參取汁漬之大佳出第四卷中

備急療大便血風冷積年多變作痔方 燒稻藁皮淋汁煎熟漬之三五度佳崔氏附復急同

灸痔法方二首

崔氏灸痔法 以繩圍病者項令兩頭相柱展繩從大椎正中量之垂繩一頭當脊正下以墨點訖又量

病者口兩吻頭接繩頭正下復點之又量病者口吻如前便中屈繩接前口吻繩頭正下復點之望使

相當所三處並下火重者各五百壯輕者三百壯即愈

又法 令疾者平坐解衣以繩當脊大椎骨中向下量至尾椎骨尖頭訖再折繩更從尾椎尖頭向上量

當繩頭正下即點之高號州初灸至一百壯得差後三年復發又灸之便斷兼療腰脚並出第四卷中

雜療痔方五首

廣濟療痔瘻瘡方 光明砂研麝香當門子研蛇皮五月五 右三味等分研先以鹽湯洗拭乾於瘡

尚德樓方  
字疑衍



上敷少蜜以散敷上差止

小品療穀道中痒痛痔瘡槐皮膏方 槐皮五兩甘草 當歸 白芷各二兩陳豉 桃仁各五十粒赤小豆各二兩

右七味剉以猪脂二升前候白芷黃膏成去滓以塗之日三度集驗

刪繁療虛勞寒下痢不止肛邊轉生肉如鼠乳在大孔傍時時膿出名壯痔鼈甲丸方 鼈甲炙乾地黃

黃連 連翹各七枯薑 黃耆 乾薑各六蟾蜍五枚猬皮炙續斷各五附子 槐子 礬石燒汁盡各四分

右十三味搗篩以蜜丸如梧桐大飲下二十九漸加至三十九日再忌如常

又療腎勞虛或酒醉當風所損腎藏病所為酒痔肛門腫生瘡因酒勞傷發瀉清血肛門疼痛蜂房膏方

蜂房三兩生槐白皮十練實桃仁各五十枚白芷二兩赤小豆一升猪膏一升右七味咬咀綿裹以苦酒

一升漬一宿下膏煎取酒盡膏成去滓取杏子大繖裏內肛門中又酒服一方寸匕出第三卷中

必效療痔及諸蟲方 石留東引根深者取一握右一味勿令見風拭去土挫又取鹿脯四指大一片炙兩

畔令熟槌碎擘以水三升煮取一升適寒溫空腹頓服之其患痔感發者服即定諸蟲無問赤白並出

差出第三卷中

脫肛方三首

病源脫肛者肛門脫出也多因久痢後大腸虛冷所為肛門為大腸之候大腸虛而傷於寒痢而用氣嘔

而氣下衝則肛門脫出因謂脫肛也出第十卷中

小品療脫肛重方 以女姜一升以器中燒生上重肛門即愈范汪集驗十金同出第十卷中

刪繁論曰肛者主大便道肺大腸合也號為通事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸二分應十二時若

藏傷熱即肛閉塞大便不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛寒大便洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之

寒則補之不虛不實依經調之

療肛門主肺熱應肛門閉塞大便不通腫縮白蜜兌通之方 以白蜜三升煎令成乾燥投冷水中可得



尚德按千金一日服

十服勿舉

重作慎舉

尚德按千金云溫清

酒一升服

方寸七半

日再若不

能酒與清

白米飲亦

得

尚德按千金宜用散

麻履底無

灸散文別

有單現故

麻履底按

法外臺合

為一方

尚德按千金

灸龜尾

尚德按千金生枯葉

根為粉以

九長六七寸許兌肛門中到身中向上入頭向下停少時兌烱斯須即通泄千金同出第三卷中

千金療肛出方磁石四兩桂心一蠟皮一枚右三味飾為散服方寸匕一日服十服即縮勿舉重須

斷房室周年乃佳出第二十五卷中又按重字下

肛門凸出方三首

刪繁療肛門主大腸寒應肛門寒則洞瀉凸出豬肝散方豬肝一斤炙黃連阿膠炙芍藥各二烏梅

肉五兩艾葉一兩右六味搗篩平旦空腹服方寸匕日再若不酒白飯服亦得千金同出第三卷中飯宋本作飯

千金肛門凸出壁土散方故屋東壁土一研其頭出處取旦英長者三挺長字下宋本有一尺二寸四字

其頭出處取旦英長者三挺長字下宋本有一尺二寸四字

又麻履底按入方麻履底鼈頭一枚右二味燒鼈頭為散敷肛門凸出頭灸履底以按熨令入永不

出矣並出第二十五卷中

卒大便脫肛方六首

肘後療卒大便脫肛方灸頂上迴髮中百壯

又方以豆醬清合酒塗之文仲備急同

又方燒虎骨末水服方寸匕日三即差

范汪療卒大便脫肛方以桑枝螺取燒末猪脂和敷之立縮亦可末以粉之備急文仲同第三卷中

千金療卒大便脫肛方以猪膏和蒲黃敷之指推內之但以粉粉之亦佳備急文仲同

又方灸鳩尾骨上七壯備急文仲集腋同出第二十五卷中

腸肛俱出方二首

肘後療若腸隨肛出轉廣不可入一尺來者方搗生枯葉取汁溫服之以猪肉汁洗手隨柳按自得入

效范汪小品深文仲備急千金同

卒大便脫肛方六首 腸肛俱出方二首

五



證云云

尚德換千金灸法別為一方

九字下宋本有忌猪生葱大物粘食等物十字

尚德換千金無此方出肘後金壯并皮海藥細半各一兩有防風二兩為十六味加至三十尚德換出字下疑脫

備急若腸隨肛出方 熱石灰令熱布裏熨之隨按令入冷即易小品文仲備急同出第八卷中

脫肛歷年不愈方三首

集驗療脫肛歷年不愈方 以生跌三斤以水一斗煮取五升以洗之日再汪千金備急文仲同出第六卷中

千金療脫肛歷年不愈方 以瓦鑿頭一枚燒令烟盡作屑以敷肛門上手按之令入氣灸橫骨一百壯

又方 以鉄精粉上按令入即愈並出第二十五卷中

疝氣及癰方六首

廣濟療疝氣核腫疼方 黃耆 桃仁去皮炙 山茱萸 五加皮 檳榔仁各八分 牛膝 茯苓各六分 薤藜子分

五味子分 人參 續斷各六分 桂心分 遠志心去 石南各五分 海藻洗 玄參分 枳實炙 龍骨各八分 薤藜子分

仁熱 右十九味搗篩蜜丸如桐子大酒服三十九日二漸加至四十九

又療腎虛疝氣腰膝冷疼陰囊腫痒狐陰九方 狐陰炙 一枕 木香 薤藜子 臘臍臍 昆布各六分 牛膝

菟絲子各八分 桃仁去皮炙 石斛分 檳榔仁分 右十味搗篩蜜和丸如梧子大空腹以酒下二十九

至三十九日再服忌熱麪蕎麥鱸魚粘食等物並出第六卷中

集驗療癰方 取楊柳如脚大指長三尺二十枚以水煮令極熟以故布乾掩腫處取柳枝更互挂之如

此取差止文仲備急千金同被挂者主刺也

千金療癰方 牡丹 海藻洗 狐陰一具 地膚子 茯苓 五味子 芍藥 橘皮各二 蜘蛛五十 防

葵 細辛 薤藜子 桂心 澤瀉各二 桃仁五十枚去 右十五味下篩蜜和服十九如梧子大稍

加至二十九忌胡荽生葱生菜酢物五卷中

備急療癰方 以桃仁搗敷之亦療婦人陰腫乾即易集驗同出第五卷中

古今錄驗療癰瘰癧九方 薤藜子 乾地黄 鹿茸炙 白欬 礞石研 礬石煨 鈇精 桂心 續

斷各五分 巴戟天 芍藥 玄參 通草 升麻 牛膝 寄生各八分 澤瀉七分 射干八分 從蓉十分 海藻八分



第字

本有忌生

血等物九

日三下宋

本有忌生

肉等物九

之字下宋

本有忌胡

英生忌五

尚德接法

疑當作方

下同

如前宋本

作忌生忌

胡妄五字

如前宋本

作忌生忌

胡妄五字

尚德接法

疑當作方

如前宋本

作忌生忌

胡妄五字

如前宋本

作忌生忌

胡妄五字

尚德接法

疑當作方

如前宋本

作忌生忌

者右二十味搗歸以蜜和為丸如梧子大飲下十九日二漸增至三十九甄立言處出第

卒病癩方五首

肘後瘰癧起躍舉重卒得陰癩方 白木分五地膚子分三桂心分一右三味搗末以飲服一刀圭日三驗古吟錄

又方 孤陰分一海藻分一牡丹皮分三桂心分二右四味搗歸為散蜜和為丸如梧子大小兒服五九大

人增之

集驗灸卒癩法 以蒲黃度口折之一倍增之以布著小腹大橫理令度中央上當臍勿使偏僻灸度頭

及中央合二處隨年壯好自養勿舉重大語怒言大笑呼喚千金范汪同

又方 牽陰頭正上向灸莖頭所極又牽下向穀道又灸所極又牽向左右髀直下行灸所極背使正直

勿偏四處炷隨年壯佳千金范汪同

又法 灸足厥陰左右各三壯穴在足大指間是也千金范汪同並

癩卵偏大方三首

千金瘰癧卵偏氣上方 牡丹 防風各一右二味搗為散溫酒服方寸匕日二忌胡荽此第二十

張文仲小品牡丹散瘰癧偏大氣服方 牡丹 桂心 防風 鉄精 豉分熱等右五味搗歸酒和方

寸匕服之小兒一刀圭二十日愈嬰兒以乳汁和大豆與之大效忌如前肘後同出

古今錄驗壯丹五等散瘰癧陰卵偏大有氣上下脹大行走腫大服此良驗方 牡丹皮 防風 黃

柏炙桂心各一桃仁二分去分去右五味搗為散以酒服一刀圭二十日愈少小癩疔最良小兒以乳汁

和如一大豆與之忌如前出第四十

灸諸癩法一十四首

千金論曰男癩有腸癩卵癩氣癩水癩四種腸癩卵癩難差氣癩水癩鍼灸易差

又卵偏大上八腹方 灸三陰交在內踝上八寸隨年壯



十米本作  
X  
尚德按指  
千金作趾  
下同

菜字下米  
本有千金  
有礬石二  
兩文仲用  
礬石十二  
小字

又男陰卵偏大癰法 灸肩井解臂接處隨年壯男癰灸小指端七壯病在左者灸左在右者灸右良效

又法 灸關元百壯

又法 灸玉泉百壯報之穴在臍下四寸

又法 灸泉陰百壯三報之在橫骨邊三寸

又癰病陰卒腫者法 令並足合兩拇指爪相並以一艾丸灸兩爪端方角處一丸令頓上兩爪角各令

半九上爪上七壯

又兩丸縮入腹法 灸三陰交隨年壯神效

又男陰卵大癰病法 灸足太陽五十壯三報之

又法 灸足太陰五十壯又在內踝上一穴

又法 灸大拇指內側去端一寸白肉際隨年壯甚驗雙灸之

又法 灸橫骨兩邊二十壯夾莖是也

又法 灸足大指理中十壯隨邊腫灸之

灸小兒癰法 先將兒至碓頭祝之曰生汝令兒某甲陰囊癰故灸汝三七二十一灸訖便牽小兒令碓

頭下向著囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗艾炷帽背頭大耳

又法 凡男癰當騎碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸軸木上隨年壯即愈並出第二卷中

陰腫方六首

病源此由風熱客於腎經腎經流於陰腎不能宣散故致腫也出第四卷中

集驗療男子陰腫大如斗核痛人所不能療者方 以雄黃一兩研碎綿裹甘草一尺生用切水一斗煮

取二升以洗之忌海藻菘菜尚德按千金有礬石二兩

又方 取蔥菜根搗薄之范汪千金同



又方 取蔓菁根搗薄之范注同並出

又方 搗馬鞭草薄之第九卷中

文仲療陰腫方 取桃仁去皮尖熬末酒服彈丸許不過三服即差千金備急同

古令錄驗療腫大如斗方 取雞翅燒灰飲服其毛一孔生兩毛者佳腫在左取左翅在右取右翅雙腫

取兩邊翅千金治小兒即腫

陰疽腫痛方一首

病源疽者氣痛也眾筋會於陰氣邪客於厥陰少陽之經與冷氣相搏則陰痛而寧縮也出第四

文仲療陰卒縮入腹急痛欲死名陰疽方 狼毒四兩防葵兩附子二兩 右三味搗篩蜜和丸如梧子

酒服三九日三夜二古今錄驗范注

陰卒腫痛方三首

文仲葛氏療男子陰卒腫痛方 灸足大指第二節下橫理文正中央五壯姚云足大指本三柱亦治小

發時腫痛蘭痛左右

備急療男子陰卒腫痛方 雞翹六枚蛇床等 右二味為末以飲服少許隨卵左右取雞羽集驗同姚

又若有息肉突出方 以苦酒三升漬烏象五枚三日以洗一日夜三四度差肘後同出

陰囊腫痛方五首

千金有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜即痛悶不得眠睡方 取生椒擇之令淨以布綿裹著丸

囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消為效乃止

又方 煮大薊根汁服一升日三不過三劑愈

又方 醋和麴炙令熱熨之

又方 以醋和麴炙之

尚德按陽病源作陰宋本二字下有忌痛肉冷水五字中字下有肘微用防風不用防瘻九小字

尚德按皮即痛悶千金作日夜瘻悶



尚從接湯  
鍼灸石病  
源作湯與  
針石送本  
同但針作  
鍼

皮字下宋  
本有若字  
槐字下宋  
本有奇異  
二字

又方 釜月下土以雞子白和敷之效 肘後並出第  
二十五卷中

陰下瘰癧方七首

病源大虛勞損腎氣不足故陰汗陰冷液自泄風邪乘之則瘰癧也其湯鍼灸石別有正方補養宣導今

附於後養生方導引法云臥令兩手布膝頭取踵置尻下以口內氣腹脹自極以鼻出氣七息除陰下濕

少腹裏痛膝冷不隨 出第四  
卷中

文仲療陰瘰癧生瘡方 嚼胡麻塗之驗 肘後十  
金同

葛氏療陰囊下濕瘰癧皮刺方 烏梅 十四枚 錢 四十 鹽 三指

效 肘後

又方 煮槐皮苦參黃柏及香蒿汁洗之並良 肘後同出  
第七卷中

救急瘰癧陰下濕瘰癧成瘡方 豬蹄 兩 槐白皮 切一升 右二味斟酌以水煮洗瘡一日五六過水差

又方 煮桃皮和黍米汁洗之 並出第  
五卷中

古今錄驗瘰癧陰下瘰癧湯洗方 甘草一尺以水五升煮取三升漬洗之日三四度便愈

又瘰癧陰下濕瘰癧生瘡方 吳茱萸一升水三升煮取三五沸去滓以洗瘰癧諸瘡亦治之 出第四  
一卷中

陰痛方三首

病源腎氣虛損為風邪所侵邪氣流入於腎經與陰氣相擊真邪交爭故令陰痛但冷者唯痛挾熱者則

腫其腸熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩足指向下挂席兩涌泉相拓坐兩足

跟頭兩膝頭外叉手互前向下盡勢七通去勞損陰膝冷 卷第四  
中

集驗瘰癧卒陰痛如刺汗如雨出方

小蒜 一斤 韭根 一斤 楊柳根 一斤

右三味合燒以酒灌之及熱氣熏

千金瘰癧陰腫痛方 灸大敦三壯

小書必受 卷三下 陰囊腫痛方五首 陰下瘰癧方七首 陰痛方三首



又方 車前子末酒服之佳出第二十卷中 陰瘡方七首 陰邊瘡方五首

陰瘡方七首

病源腎榮於陰腎氣虛不能制津液則汗濕虛則為風邪所乘邪客腠理而正氣不泄邪正相干在於皮膚故瘡搔之則生瘡出第四卷中

千金療陰下生瘡洗湯方 地榆 黃柏各八兩 右二味以切水一斗煮取六升去滓適寒溫洗瘡日再

只以黃柏湯洗亦效

又凡妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似疳瘡作白方 用銀釵以綿裹用臘月豬脂重黃

火上煖以釵烙瘡上令熱取乾槐枝熟塗之以麝香黃礬青礬末敷之小便後即敷之不過三兩度差

但用疳瘡方中藥敷之即差出第二十五卷中又按槐枝十金作枝末本

葛氏療男子陰瘡方 爛煮黃柏洗之又用白蜜塗之

又方 黃連黃柏各等分末之先煮肥猪肉湯洗之然後以藥粉之

又方 以蜜煎甘草末塗之太良比見有人患塗頭腫坎下瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之并用前粉粉之

及依陶方即差神驗出第七卷中

必效療陰生瘡膿出作白方 高昌白礬兩一 右一味搗細研之鍊猪脂一合於磁器中和攪作膏取槐

白皮切作湯洗瘡上拭令乾即取膏敷上及以楸葉貼上不過三兩度永差

古今錄驗瘡陰瘡方 黃柏 黃連各三 胡粉一合 右三味搗為末粉上日三婦人綿裹棗核大內之出

卷中

陰邊瘡方五首

必效療陰瘡陰邊如粟粒生瘡及濕癢方 以槐北面不見日處白皮一大握鹽三指一撮以水二大升

煮取一升洗之日三五遍適寒溫用若涉遠恐衝風即以米粉和塗之神效

尚德按金  
字下千金  
有齋食之  
大痛即  
不痛九字  
宋本同但  
白作時葛  
作劇瘡作  
甘

尚德按金  
字下千金  
有齋食之  
大痛即  
不痛九字  
宋本同但  
白作時葛  
作劇瘡作  
甘

尚德按金  
字下千金  
有齋食之  
大痛即  
不痛九字  
宋本同但  
白作時葛  
作劇瘡作  
甘



尚德按頤  
疑當作頤  
下並同

又療陰瘡有二種一者作白膿出名曰陰蝕瘡二者但赤作瘡名為熱瘡若是瘡用此方 取黃柏黃芩

各一兩切作湯洗之用黃柏黃連末粉之云神良

又方 以黃連和胡粉末敷之必效

又方 紫芽茶末分荷葉燒研 右二味為末以鹽漿水洗訖敷之三二度即愈

又方 取停水處乾卷地皮末敷之神效是長安郭承恩用之得效出第四卷中

著硃砂方四首

救急避毒硃砂損陰方 猪蹄一具浮萍草三兩 右二味以水三大升煮取半升去滓以瓶子盛汁內

陰瓶中漬之冷即出拭乾便敷後藥粉之

又粉法 薔薇根皮 黃柏各三分 朴硝 蛇床子各一分 甘草二分 右五味搗為散用前法浸洗後以粉

瘡上亦不甚痛慎風出第八卷中

必效主著硃砂方 取雞子一枚者熟剝取肉更用生雞子二個傾取白和熟研令細以綿裹之立定奇效

明云

又方 甘草 黃柏 白礬燒各汁盡 右三味為末敷之出第四卷中

九蟲方一首

病源夫九蟲者一曰伏蟲長四寸二曰蛔蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀

如蠶形六曰胃蟲狀如蝦蟆七曰弱蟲狀如疥辨八曰赤蟲狀如生肉九曰蟻蟲至細微形如菜蟲伏蟲

羣蟲之主也蛔蟲貫心則殺人白蟲相生子孫轉大長至四五尺亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬

救胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名隔蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟻蟲居腸腸多則為痔劇則為癰

因人瘡處以生諸癰疽癰瘻癰疥齕蟲無所不為人亦不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無者此諸

蟲依腸胃之間若臟腑氣實則不為害若虛則能侵蝕隨其蟲之動而變成諸患也集驗同出第十八卷中

尚德按病源四寸作四分辨作辦隔作腸宋本日蟻下有奇饒二小字蛔字下有徒棘切大腸也六小字



集驗貴衆丸主療九蟲動作諸病方貴衆煮石蠶五分狼牙四分雀蘆二分宋本蜀漆六分蠶蠶三分

雷丸六分蕪荑四分厚朴三分檳榔六分右十味搗篩蜜丸空心煖漿水服三十丸日三不知稍稍加之白蟲

用櫃子湯服備急文仲古今醫驗注同出第九卷中

五臟蟲方七首

刪繁療脾勞有白蟲長一寸在脾為病令人好嘔而胸中駭駭一作嘔而不吐出前胡湯方 前胡 白

朮 赤茯苓略三枳實略二細辛三旋覆花兩常山兩松蘿兩龍膽兩竹葉切一杏仁三兩去右十

一味切以水一斗煮取三升去滓分三服若腹中熱滿下芒硝三兩黃芩三兩苦參二兩加水二升依

方煎忌如常

又療脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔柴黃根下蟲湯方 柴黃東引根大者一尺切大麻子八橘皮兩

切 右三味切搗麻子爛並和煎服或下黃汁凡合藥禁聲勿語道作藥蟲當聞便不下切須忌之甚

驗以水煎服臨時量之效

又療肺勞熱損生肺蟲形如蠶在肺為病令人欬逆氣喘或謂憂悲氣隔寒熱皆從勞之所生名曰膏肓

鍼灸不著麥門冬五兩下氣丸方 麥門冬去心兩蜀椒分四遠志 附子炮裂乾薑五分甘草十分人參分

細辛分六桂心分五百部根 白朮 黃耆略五杏仁四十枚檳榔五右十四味搗篩蜜丸如彈子許含一

丸稍稍嚥汁忌如常

千金療腎熱四肢腫急蜷蟲如菜中蟲生腎中為病方 貴衆大者三枚乾漆二兩柴黃六分一云杏仁十

枚蕪荑 胡粉 槐白皮分各四右七味搗散平旦以井花水服方寸匕增之以差止

又肺勞熱生蟲在肺為病方 東行桑根白皮切一升東行柴黃根切五兩狼牙三兩右三味切以酒七升煮

取一升半平旦服盡

又療肝勞生長蟲在肝為病令人恐懼不安眼中赤方 雞子五枚東行柴黃根切三兩乾漆四兩粳

如常宋本 作桃李生 肉大酢生 葱生菜等 十一字 尚德按隔 疑當作腸 如常宋本 作猪肉冷 水海藻松 菜生葱生 肉等十七 字 尚德按千 金五兩作 五合無半 字 尚德按千 金三升作



三兩半升  
作半升服

一百丸  
尚德按蛔

蟲千金作

日蟲宋本

作蟲

又按千金

寶衆二枚

種蠶三七

狀有石蠶

五分吳茱

黃根皮七

分爲十二

味若酒下

二十九

尚德按臘

疑當作蠟

並便宋本作

源作貫宋

本同

尚德按種

病源作腫

又按貫病

疑當作蠟

米粉半升 右五味搗茱萸根漆為末和藥銅器中打雞子調火鍊可丸如小豆宿勿食且以飲服一百

二十九小兒五十九蟲即爛出差

又療心勞熱傷心有長蟲名蛔蟲長一尺貫心為病方 雷丸煮橘皮 桃仁各五狼牙各六貫衆三蘆薈各

青箱子 乾漆無名亂髮如雞殭蠶二十 右十味搗篩蜜丸以飲及酒空腹服二七丸日再服之出並

長蟲方二首

集驗療長蟲雞子丸方 雞子白三枚乾漆四兩熬臘三粳米粉半 右四味內銅器中於微火上煎攪令

調內粉令凝可丸置土上溫乃內雞子攪令相得又煎令可丸宿勿食以飲下小豆許大一百二十九

小兒五十九丸效驗

又方 取棟實以瀉苦酒中漬再宿以絲裏內下部中令人三寸許一日易之千金范汪同並出第九卷中尚德按千金治蛇蟲在

漸瀕人

蛔蟲方九首

病源蛔蟲者是九蟲之一也長一尺亦有長五六寸或因腑臟虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹

中痛發作種聚去來上下痛有休息亦攻心痛口中喜涎及吐清水責傷心者則死診其脈腹中痛其脈

法當沉弱弦令反洪而大則蛔蟲也出第十卷中

廣濟療蛔蟲方 酸石榴根東引八土五檳榔十枚 右二味以水七升煮取二升半絞去滓著少米煮

稀粥平旦空肚食之少間蟲便死快利效無忌出第四卷中

肘後療蛔蟲或攻心痛如刺口中吐清水方 取龍膽根多少任用以水煮濃汁去滓宿不食平旦服一

二升不過再服下蛔蟲也

又方 取有子棟木根剉以水煮取濃赤黑汁用米煮作糜宿勿食旦取肥香脯一片先喫令蟲聞香攀



頭稍從一口為度始少進漸加服一匕服至半升便下蛔蟲千金文

又方 以雞子一枚開頭去黃以好漆少許內中相和仰頭吞之蟲悉出矣文仲集驗備急千金同出第二卷中

集驗蛔蟲攻心腹痛方 取薏苡根二斤剉以水七升煮取三升先食盡服之蟲死盡出千金范汪同出第九卷中

千金療蛇瘡方 蘆蘆下篩以餅臈和服方寸匕蟲不覺出之亦主蜣蟲出肝臟云蘆蘆一兩末以羊肉

崔氏療蛇蟲方 取綠蠶蛹汁空腹飲之良若非綠絲時即須收蠶暴乾患者搗篩取意斟酌多少和粥

飲服之

又方 鶴虱三兩 右一味搗散以肥豬羊肉但得一色以葱豉為臈汁每旦空腹服以臈汁和一方寸匕

頓服稍多飲臈汁佳若不能散服即以蜜和為丸如梧子一服十丸遂以此臈汁下之假令明旦服今

日暮即勿食明旦服藥訖遂至已時為佳要服此丸散使盡已後三十日勿雜食水差出第五卷中

必效療蛔蟲方 萊豆三升煮取濃汁麻子一大升研取汁一升以下然後取麻子汁半升和豆汁一升

更煖令溫溫正發即炙羊肉臈令熟先含嚥汁三五嚥即服之須臾即吐出或利其蟲已消如綿練帶

三二百條如未盡更服即水絕郭參軍云類試無不差者一

寸白蟲方一十九首

病源寸白者九蟲之一也長一寸而色白形小扁因臈臟虛弱而能發動或云飲白酒以桑枝貫牛肉炙

食之并食生魚所成又食生魚後即飲乳酪亦令生之其發動則損人精氣腰脚疲弱又云此蟲生長一

尺則殺人出第十卷中

廣濟療白蟲如馬蘭葉大於下部出不盡以刀截斷者令人漸漸羸瘦石榴湯方 醋石榴根東引者無

美三兩牽牛子熟桐 右三味以水六升煮取二升去滓分三服別和牽牛子末每服如人行五里更服

盡快利蟲亦盡死出生冷豬肉白酒葵筍等此方神驗

又方 狼牙 白欬俗名四 蕪荑俗名六 右三味搗散空肚以大醋和如膏溫頓服之無所忌千金同並出第四卷中



通按牙子  
即狼牙

棟宋本作  
橋

尚德按瘡  
疑當作瘡

又按論疑  
當作論

餘字下宋  
本有日字

火宋本作  
只然

肘後療白蟲方 瀉漆 猪血各三 右二味相和微火上煎之不著手成宿勿食空腹旦先吃肥香脯

一片服如大豆許百一九日中蟲悉出亦主蛇蟲范汪同

又方 濃煮猪肉汁煎檳榔三十枚取三升服之蟲盡出文仲備急同

又方 熟煮猪脂血宿勿食明旦飽食之蟲當下文仲備急同

范汪療白蟲橘皮丸方 橘皮加牙子 蕪荑范汪 右三味搗篩蜜丸如梧子以漿水下三十丸先食

日再服

又方 狼牙雨 右一味搗篩蜜丸如麻子大宿不食明旦空腹以漿水下合服盡差

又方 棟實破其上取皮中子搗合蜜丸如梧子宿不食旦以醋漿水若米汁下三百丸蟲並死或以麝

爛皮亦可丸服八十九丸忘如常法出第十卷中

備急療白蟲蕪荑散方 狼牙三分 蕪荑二分 右二味搗為末酒和服之先食脯後頓服盡立差張文仲同

六卷

救急療白蟲方 石榴枝東引者一檳榔也 右二味以水二大升煮取強半頓服欲服時先嚙虎脯嚙

汁即進之每月一二三日嚙藥必差以蟲頭向上月三以後服藥不效為其蟲頭向下也今日欲服預

前一日莫食其蟲吃藥之後或刺出或內消皆差忌食生繪白酒諸生肉冷物一月餘

又方 取榧子一百枚去皮大然咬之能食盡佳不能者但咬五十枚亦得經宿蟲消自下無忌崔氏同

中卷

崔氏療白蟲諸方不差方 取石榴東引根令患人以手大指與第三指滿一握兩頭出者總留之又取

乾脯肥者手大一片細剉以水四升漬之一宿明旦煮取一升去滓分三服如人行十里久每欲服先

嚼脯一片然後飲藥并令人以手按所患入腹令藥易宣都服了有頃當自便蟲出服藥以月一至五

日以前是蟲頭向上服之得力無問多少皆得出盡若疑蟲未盡更合一劑永愈



又方 東引萊蕪根一大麻子升大 右二味先搗麻子極碎又盆中熟研以水一大升更和研絞取濃

汁以浸萊蕪根一宿明旦煮兩三沸頓服如不頓服分再服至明旦欲服藥今日午後便不得食仍須

先嚼一片肥乾脯噉汁然後服藥服一劑去蟲不盡停一日更作服一劑永差後一月日勿食脂膩魚

肉必效出第五卷中

千金療白蟲方 取樞子四十丸枚去皮以月上旬旦空腹服七枚七日服盡蟲消為水永差

又方 取萊蕪北陰根洗去土切以酒一升漬一宿平旦去滓分再服凡萊蕪皆用細根東北陰者良若

指以上大者皆不佳用之無力說注

又方 熬錫令速燥末平旦作羊肉臠以藥方寸匕內汁中服之一方熬胡粉

又方 桑白皮切三升以水七升煮取二升宿不食明旦頓服之

又方 用石榴根如萊蕪根法

又方 胡麻升胡粉兩 右二味搗末明旦空腹以猪肉臠汁服盡即差並出第十卷中

蟯蟲方六首

病源蟯蟲是九蟲之一也形甚小如今之蝸蟲狀亦因腑臟虛弱而致發動甚者則能成痔瘻疥癬癰

疽痛諸瘡蟯蟲此是人體虛弱極重者故蟯蟲因之動作無所不為也出十八卷中

范汪療蟯蟲花散方 芫花 狼牙 雷丸 桃仁去皮 右四味搗散宿勿食平旦以飲服方寸匕

當下蟲也

又巴豆白膏療蟯蟲方 巴豆一枚燒令烟 桃仁四枚熱令 右二味合搗作三九大人清旦未食以漿

服盡少小服一九若不下明旦更復作服並出第十卷中

千金療蟯蟲在胃中漸漸羸人方 瀉酒 白蜜 好漆格一 右三味合銅器中微火上煎之令可丸

丸如桃核大一枚宿勿食空腹溫酒下蟲不下再服之附後備急集驗說注

尚德按出字下疑脫第字下本有各三分三字

數字下本有本字

致字下本有不用本有四字尚德按九千金作九宋本同尚德按洗千金作乾尚德按千金錫作錫連作十分



備急葛氏療蛇蟲攻心如刺吐清汁方 搗生艾汁宿不食平旦嚼脯 片令蟲聞香後飲汁一升當下

蛇蟲 備急文仲並同 附後云瘡蛇蟲

陶氏療蟲方 取七月七日疾藜子陰乾燒作灰先食服方寸匕一服三日止 范汪千金同

又方 以好鹽末二兩滴酒半升於銅器中煮令數沸宿勿食清旦溫空肚頓服之 備急文仲千金范汪等同並出第七卷中

三蟲方七首

尚德按千金治蛇蟲攻心腹痛尚德按千金治蛇蟲用苦酒溫來本作沸

病源三蟲者長蟲赤蟲蛭蟲為三蟲也猶是九蟲之數也長蟲者蛇蟲也長一尺動則吐清水出則心痛貫心則死赤蟲狀如生肉動則腸鳴蛭蟲細微形如菜蟲也居腸胃之間多則為痔劇則為癰因入瘡處即生諸癰疽癰瘻癰疥齕蟲無所不為此既是九蟲內之三者而今別立名者當以其三種偏發動成病故謂三蟲也其湯射鐵石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以兩手著頭相叉長引氣即吐之坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝中疾低頭入兩膝間兩手交叉頭上十二通愈三蟲又云叩齒二十七過輒咽氣二十七如是三百通乃止為之二十日邪氣悉去六十日小病愈百日大病除三蟲伏尸皆去面體光澤 出第十卷中

肘後療三蟲方 萊菔根 取東引指大者長一尺 枯薑 四兩 右二味細剉萊菔根以酒一升漬之一宿旦絞去滓

宿勿食旦空腹先吃脯然後頓服之小兒分三服亦療寸白蟲

又方 搗桃葉絞取汁飲一升 千金集驗同方云平旦飲三合

又方 真珠研 兩 亂髮 如雞子大燒末 右二味內苦酒中旦空腹頓服之令盡 集驗范汪同千金治蛇蟲

又三蟲者謂長蟲赤蟲蛭蟲也乃有九種而蛭蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一

尺則殺人服藥下之須結裏潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速從之蛭蟲多是小兒患之大人亦

有其病令人心痛清朝口吐汁煩燥則是也其餘各種種不利人人胃中無不有者宜服九蟲丸以除之

范汪療三蟲白斂丸方 白斂 狼牙 蘆蘆 桃花 貫眾 橘皮 分 燕美 分 右七味搗篩蜜丸

裴來本作表尚德按疑當作躁



如小豆大宿勿食旦以漿水服一劑日中乃食立下男子病大腹面黃欲食肉服此藥下赤蟲如笋莖者一尺所有頭目百餘枚病愈又九江謝丘病脇下有積大如杯小腹亦堅伏痛上下移嘔逆喜唾心下常痛欲食肉服此藥下蟲無頭足赤身有口尾二百餘枚得愈又九江陳昉病大腹煩滿常欲食生菜服此藥下白蟲大如臂小者百餘枚立差妊身婦人不得服之

又療三蟲竹節丸方 燒竹節 雷丸銘 三錫屑仁橘皮 一分 右四味搗篩蜜丸如梧子大一服八九日三服

又療三蟲芎藭散方 芎藭 雷丸 桔梗 白芷銘 右四味搗散以蜜飲苦酒或米汁服方寸匕

日三服又可用蜜丸如梧子吞十三丸當稍稍下不盡更服一劑出第十卷中 備急療三蟲方 藿蘆四兩 乾漆二兩 吳茱萸四兩 右三味為末依前法嚙脯以粥清服方寸匕日一服

汪微范

### 雞療蟲方三首

廣濟療蛔蟲寸白蟲方 檳榔針二 當歸 鶴蟲 蕪荑義橘皮 各六貫衆 雷丸各四 右七味搗散

空腹煮大棗湯服方寸匕日二服漸加至三七微利無忌出第四卷中

千金療燒蟲蛔蟲及痔蟲食下部生瘡桃湯方 桃皮兩 槐子三 艾葉一 大棗三十 右四味以水三

升煮取半升空腹頓服之出第八卷中

療寸白蟲化為水泄出未除方 檳子 檳榔 蕪荑義 三味為散溫酒服二錢匕先燒牛肉脯吃後

服藥



唐王燾先生外臺秘要方卷二十七目錄淋并大小便難  
病二十七門

諸淋方三十五首

五淋方三首

石淋方一十六首

血淋方五首

小便赤色如紅方三首

熱淋方三首

勞淋方三首

氣淋方五首

膏淋方二首

許仁則淋方二首

大便難方六首

大便不通方一十七首

大便閉澀不通方七首

大便失禁并關格大小便不通方二十二首

關格脹滿不通方四首

許仁則大便暴閉不通方三首

小便不通方一十二首

小便難及不利方九首

遺尿方六首

尿血方一十一首

胞轉方一十五首

小便血及九竅出血方一十二首

小便不禁方二首

小便數及多方五首

許仁則小便數多方四首

尿淋方六首

灸穴雜法一十二首

尚德按今  
有方一首

尚德按開  
疑當作二  
尚德按三  
疑當作二  
尚德按二  
疑當作三



分  
行  
不  
同  
之  
處  
三  
十  
三

一



唐王燾先生外臺祕要方卷二十七

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新 安 後 學 程 行 道 敬 通 父 訂 梓

諸淋方三十五首

病源諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與腎為表裏俱主水水入小腸下於胞行於陰為溲便也腎氣通於陰陰津液下流之道也若飲食不節喜怒不時虛實不調則腑臟不和致腎氣虛而膀胱熱也膀胱津液之腑熱則津液內溢而流於畢水道不通水不上不下停積於胞腎虛則小便數膀胱熱則水下澀數而且澀則淋瀝不宣故謂之淋其狀小便出少起數少腹弦急痛引於臍又有石淋勞淋血淋氣淋膏淋諸淋形證各隨名具說於後章而以一方療之者故謂諸淋也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云偃臥令兩足布膝頭斜踵置鳩口內氣振腹鼻出氣去淋數小便又去石淋莖中痛又云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝內入至足跌上急手握足五指極力一通令內曲以利腰髀療淋也

出第十卷中

廣濟療患淋來積年比醫療不能得愈或十日五日一發即有可時今年因病更頻數二十日來不定方

滑石 冬葵子各八分瞿麥 石葦各五分蒲黃六分陳橘皮四分藥 茯苓 芒硝各六分 右十

味搗篩為散空腹煮後飲子服方寸匕日二服漸加至一匕半忌熱麵炙肉醋蒜等

又飲子方 桑白皮六分通草 百合各八分白茅根一分 右四味細剉以水四升煮取二升去滓溫下前散

藥口乾渴含之亦得也

又療淋小便不通六七日方 滑石五兩通草三兩瞿麥二兩冬葵子一兩茅根升石葦三兩芒硝二兩 右七味切

以水九升煮取二升八合去滓內芒硝分溫三服每服如人行六七里進一服以微利為度忌如前

愈來本作  
損數字下宋  
本有今字  
半字下宋  
本有不利  
二字  
一分來本  
者十分新

第四卷中



范汪療淋方 取繁縷草滿兩手把以水煮服之可常作飲勿不飲也

又方 煮兔絲子服之如繁縷法

又方 露蜂房燒飲服之取如碗大者妙

又方 雞子二枚去白黃以鹽內殼中使滿以三升水漬一升絞取汁取殼中鹽投汁中攪令調盡服

又方 滑石 海蛤 雞子壳各等 右三味搗篩為散以飲服牛錢匕日三服漸加至一錢匕甚良

又方 取地麥草一名地膚草二七把以水二升煎之亦可長服一法旦漬豉汁飲之良

又療淋利小便葵子散方 葵子半滑石二石南葉一地榆三石葦一兩通草兩右六味搗篩為散飲

服方寸匕日三服良

又療淋莖中有石方 取雞屎白半升暴乾熬之令香搗篩為散以酪一漿飲方寸匕日三服到一二

日當下石即愈

又療淋師所不能療者神方 取葛上亭長生折斷腹腹中有白子如小米長二三分取著白板上上陰

乾燥二三日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小盆中水如裏許內藥

盞中半食頃以爪甲研當令扁扁見於水中仰頭令人為入咽喉中勿令近牙近則著牙齒間不盡得

入咽之也藥雖微小下喉自當覺至下焦淋所有項藥作大煩急不可堪者飲麥乾飯汁藥勢止也若

無麥乾飯汁但水亦可耳老小服三分之一藥當下淋如膿血連連爾石去者或如指頭或青或黃男

女服之皆愈并瘡婦人產後生餘疾積聚或成帶下服之亦愈此蟲正月二月為羌青三月為王不留

行四月五月六月為葛上亭長七月為班貓九月十月為地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若淋不

止以意節度更增服之

並出第六十五卷中

小品地膚湯療下焦諸結熱小便赤黃數起出少大痛或便血溫病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及步行冒熱冷飲遂熱結下焦及乳石熱動關格少腹堅胞脹如斗大諸淋服之即通方 地



便宋本作行

尚德接骨  
書食實志  
云元帝過  
江用孫氏  
舊錢輕重  
謂之大者  
謂之小者  
謂之輪  
四文  
良字下宋  
本有忌酢  
桃李在肉  
等七字  
服字下宋  
本有忌酢  
肉桃李酢  
物等八字  
尚德接十  
金芽根石  
首魚頭石  
各三兩

膚草三知母

栝苓去瞿麥

黃芩

升麻

通草各二兩

海藻一兩

葵子升

枳實二兩

右十味切以水

九升煮取三升分

為三服大小便皆閉者加大黃三兩婦人房勞腎中有熱小便難不利腹滿痛脈沉

細者加豬腎一具

水千金同崔氏云若加豬腎先以

煮取三升溫服一升旦服忌海藻松菜

並出中

又療淋榆皮湯方

榆皮半斤

滑石二兩

黃芩一兩

甘草二兩

瞿麥各二兩

葵子升

右六味切以水一斗

煮取三升溫服一升旦服忌海藻松菜

並出中

集驗療淋方

以比輪錢三百文以水一斗煮取三升飲之神效

詳後同千金治氣淋通按此輪錢未

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈

效同

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈

效同

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈

效同

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈

效同

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈

效同

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈

效同

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈

效同

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈

效同

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈

效同

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方

燒頭髮灰服之良

文仲同並出

又方







下如下宋  
本有字  
日宋本作

范汪療五淋方 麝香五分熱 斑蝥二分去足熱 地膽二分去足熱 豬苓分三 右四味搗篩為散每服四分匕日

進三服夜二服但少腹有熱者去豬苓服藥二日後以器盛小便當有所下肉淋者下碎肉血淋者下如短繩若如肉膿氣淋者下如羹上肥石淋下石或下砂劇者十日即愈禁食羹豬肉生魚葱鹽醋以小麥汁服之良

又療五淋神良延命散方 滑石 礬石燒半 石膏 車前子 露蜂房炙并白貝子搗著苦酒中二

相子仁 魚鱗熟令 雞矢白 苦瓠中穰并子 特牛陰頭毛燒 芒硝熟令汁盡 白雞臍裏黃皮熟 婦

人陰上毛二分燒 右十四味搗篩為散每服半錢匕加至一錢匕日三夜一服以葵子飲下之三日

愈甚者不過六七日愈小便便以器盛之當見石及諸物也並出第十卷中

必效療五淋方 白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升去滓分三四服附後千金同出第三卷中

石淋方一十六首

病源石淋者淋而出石也腎主水水結則化為石故腎客砂石腎虛為熱所乘熱則成淋其病之狀小便

則莖裏痛弱不能卒出痛引少腹膀胱裏急砂石從小便道出甚者塞痛令悶絕出第十卷中

范汪療石淋方 鼈甲燒灰搗篩為散酒服方寸匕頻服數劑當去石也附後

又方 取人家籬牆上連蔓葎闊掘出見其根挽斷以杯於坎中承其汁服之一升石自當出若不出更服一升

又方 取車前子二升用絹囊盛之以水八升煮取三升去滓頓服之移日又服石當下也宿勿食服之

神良附後千金同

又方 相子仁 芥子 滑石各等 右三味搗篩為散以麥汁飲服方寸匕日三服已效

又方 牛角燒灰服方寸匕日五六服任意飲酒

又方 瞿麥子搗篩末酒服方寸匕日三服至一二日當下石又香薷搗作屑以酢漿飲服方寸匕日三

通按本草  
無律開別  
本作葛作  
即律草也  
又名勒草  
尚德按開  
字當為下  
大開掘究  
極作坎也



石字下宋  
本有小便  
於器中五  
即字下宋  
本有便字

服字下宋  
本有無苦  
毒三字  
及宋本作

通按此方  
與前延命  
散同但多  
牛角鯉石  
膏二味少  
卷石石膏  
雞腔脰三  
味

至二三日當下石並出第十  
五卷中

小品療石淋方 浮石取滿一手搗為末以水三升苦酒一升煮取二升澄清溫服一升不過再三服石

即出古今錄驗千金崔  
氏同出第四卷中

集驗療石淋方 鯉魚齒一升貝齒一升搗篩以三歲苦酒和分為三服宿不食旦服一分日中服一分

募服一分古今錄驗  
范汪同

文仲石淋方 桃膠如棗大夏月者三合冷水中冬月以湯三合和之一服日三當下石石盡即止古今  
錄驗

同

又方 濃煮車前草汁飲之良也古今錄驗同  
出第四卷中

古今錄驗療石淋及諸淋方 石首魚頭石四當歸等右二味搗篩為散以水二升煮取一升頓服

立愈單用魚頭石亦佳

又石淋石葦散方 石葦去滑石右二味搗篩為散用米汁若蜜服一刀圭日二服范汪  
同

又方 取生葶藶搗取汁三升為三服石自出范汪  
同

又滑石散療石淋莖中疼痛瀝瀝晝夜百餘行內出石及血方 滑石二十石葦去當歸通草 地膽

法足鍾乳二分車前子三分瞿麥 蛇床子細辛蜂房炙各右十一味為散以葵汁麥粥服方寸

匕日三生葱生菜五字

又療石淋瀝瀝莖中痛晝夜百行或血出延命散方 滑石 牛角鯉燒灰芒硝各二瞿麥三車前子 露

蜂房炙貝子燒柏子仁 魚齒炙雞矢白 苦梔子燒牛陰頭毛各一婦人陰上毛二分一右十三

味搗篩為散以葵汁服方寸匕日三服

又療石淋方 取雞子陳者一枚用苦酒一升以雞子合苦酒置器中以油紙三四重密封頭不令水得

入沉井中一宿平旦取剝去皮吞其黃石即消去並出第二  
十六卷中



血淋方五首

病源血淋者是熱淋之甚者則尿血謂之血淋心主血血之行身通遍經絡循環臟勞熱甚者則散失其常經溢滲入胞而成血淋也

出第十卷中

廣濟療血淋不絕雞蘇飲子方

雞蘇一握竹葉一握石膏八分生地黃切一升蜀葵子四分末

湯或下 右五味以

水六升煮取二升去滓和葵子末分溫二服如人行四五里久進一服

古令錄驗

通草五兩

又療血淋小便疼痛方

雞蘇二兩滑石五兩生地黃一斤小蘇根兩竹葉二兩

通草五兩

右七味細

判以水九升煎取三升去滓分溫三服如人行四五里進一服

並出第四卷中

千金療血淋方

石葦去當歸芍藥蒲黃各等

右四味為散酒服方寸匕日三服

附微文仲同出第二十卷中

備急陶氏療淋下血二升者方

取苧麻根十枝以水五升煮取二升一服血止神驗

附微古今錄驗同

又方

灸足大指前節上十壯良

並出第六卷中

小便赤色如紅方三首

延年論曰療小便赤色如淺紅花汁此是憂愁驚恐心氣虛熱客邪氣與熱搏於心所以小便赤心主南方火王在四月五月六月其色赤驚恐動於心心不受邪邪即傳於小腸滲入胞中所以小便赤此為微邪其病猶輕令服九子即得漸差心即是火火惡於清清即是水水能滅火既損心氣即不得食熱及冷水并勿憂愁如不慎恐小便色赤如血漸即難愈令處乾地黃丸補心神益脾氣散客熱自然調和小便色即自變如常第一不得憂愁在心并勿食熟食及冷水等方

乾地黃黃耆各六兩防風遠志茯苓

神 栝蒌

子各一兩鹿茸三兩龍骨四分五

人參五分滑石十二石葦刮去皮

當歸各二兩芍藥蒲

黃

甘草炙或鹽烙三車前子八分

右十八味歸為末以蜜及棗膏各半相和煎令消散和藥為丸如

梧桐子大每食後少時以粥清下十九日二三稍加至十五二十九以知為度

詩考

又茅根飲子療胞絡中虛熱時小便如血色方

茅根一握苓三人參

乾地黃兩

右四味切以水五

通按小蘇根疑是小蘇根服字下宋本有不利忌燕薹麴蒜陳莫物十字

度字下宋本有禁熱食及冷水梅澤松來



燕薹酢十

宋本云通

草三兩葵

子四兩滑

石二兩碎

湯浸去毛

右四味切

以水六升

煎取二升

去滓分溫

三服每服

如人行八

九里進之

忌食五辛

麤炙肉出

第十卷中

華字下宋

本有時進

二

高德按十

金滑石二

分甘遂一

以麻子

散五合和

三服下米

熱淋方三首

升煮取一升五合去滓分溫五六服一日食盡大仲處宋本一日食盡作中間任食一日令盡

文仲通草飲子主熱氣淋澀小便赤如紅花汁色方 通草 葵子 茅根 王不留行 蒲黃 桃膠

瞿麥 滑石 甘草 右九味切以水一斗煮取六升去滓分溫五六服忌如藥法

熱淋方三首

病源熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入於胞而成淋也其狀小便赤澀亦有宿病淋今得熱而發者其熱

甚則變尿血亦有小便後如似豆羹汁狀者畜作有時也出第十卷中

廣濟療熱淋方淋字下宋本有車前草切一通草三兩葵根切一芒硝六分湯

取二升絞去滓內硝分溫三服服別相去如人行六七里微利為度忌熱食出第四卷中

古今錄驗療淋小便數病膀胱中熱滑石散方 滑石二兩栝蒌三兩石葦二分右三味搗篩為散以大麥

粥清服方寸匕三日並出第二十六卷中

近效療熱淋日夜數十度服藥不差方 空腹服井花水一二升必差韋鴻臚進用如神效方喫水了後

行六七百步甚良

勞淋方三首

病源勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎氣通於陰其狀尿留莖內數起不出引少腹痛小便不利勞

倦即發也出第十卷中

千金夫勞淋之為病勞倦即發痛引氣衝灸之方 灸足太陰百壯在內踝上三寸三報之療與氣淋同

又療五勞七傷八風十二痺以為淋勞結為血淋熱結為肉淋小便不通莖中痛及少腹急痛不可忍者

方 滑石二兩王不留行 冬葵子 車前子 桂心 甘遂 通草各二兩石葦四分右八味搗篩為散

以麻子粥五合和服方寸匕日三服尿清差並出第二十一卷中

古今錄驗療石淋勞淋熱淋小便不利胞中滿急痛石葦散方 通草二兩石葦二兩王不留行一兩滑石二兩



本有忌海  
藥按米桃  
李桂肉等  
十字

尚德按氣  
病源作虛

尚德按今  
有方一首

尚德按千  
金律草汁  
二升酢二  
合大作小

又按若疑  
當作苦

甘草灸當歸各二兩 白朮 瞿麥 芍藥 葵子各三兩 右十味搗篩為散先食以麥粥清服方寸匕日  
三服出第二十卷中

### 氣淋方五首

病源氣淋者腎虛膀胱熱氣脹所為也膀胱與腎為表裏膀胱熱氣流入胞熱則生膏令胞內氣脹則  
小腹滿腎氣不能制其小便故成淋耳其狀膀胱小便皆滿尿澀常有餘澀是也亦曰氣癰診其少陰脈  
數者男子則氣淋出第十卷中

千金療氣淋方 灸關元五十壯

又方 夾玉泉相去一寸半灸三十壯

又方 水三升煮豉一升一沸去滓內鹽一合頓服之

又方 檮葵子末湯和服方寸匕

又方 空腹單茹蜀葵一滿口

### 膏淋方二首

病源膏淋者淋而有肥狀如膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也出第十卷中

千金療膏淋方 檮葵草汁三升酢三合和空腹頓服當如大豆汁下一名葛律也

又膏淋之為病尿似膏自出療之一如氣淋也並出第二十一卷中

### 許仁則淋方二首

許仁則瘳小便淋澀方此病有數種有石淋有熱淋有氣淋氣淋者氣擁塞小便不通遂成氣淋此病自  
須依前療水氣法石淋者緣先服石石氣不散擁遏生熱故成石淋熱淋者體氣生熱更緣食飲將息傷  
熱熱氣灼灼遂成熱淋更無餘候但若體氣熱小便澀出處酸澀宜依後瞿麥等六味湯大蟲蛄等五味  
散三淋俱服之方 瞿麥穗兩 冬葵子升 榆白皮物切 桑根皮兩 白茅根升 石葦四兩 右藥切以水



一斗煮取三升去滓分溫三服每服如人行十里久服三五劑後宜合大蟲醃五味散服佳

又方 大蟲醃石韋三兩瞿麥穗四兩葵子升茯苓六兩右藥搗篩為散者桑白皮作飲子初服一方

寸匕日再服稍加至三匕忌酢物吳昇同出下卷中

大便難方六首

尚德按病源五穀作水穀機作壅從下而上作從上向下

尚德按服病源作服宋本同

通按此即仲景麻仁丸方去杏仁也

病源大便難者由五臟不調陰陽偏有冷熱虛實三焦不和則冷熱并結故也胃為五穀之海水穀之精化為榮衛其糟粕行之於大腸以出也五臟三焦既不調和冷熱擁塞結在腸胃之間其腸胃本實而又為冷熱之氣所并結聚不宜故令大便難也又云邪在腎亦令大便難所以爾者腎臟受邪虛而不能制小便則小便便利津液枯燥腸胃乾澀故大便難又渴利之客大便亦難所以爾者為津液枯竭致令腸胃乾燥診其左手寸口人迎以前脈手少陰經也脈沉為陰陰實者病苦閉關大便不利腹滿四肢重身熱若胃脹右手關上脈陰實者脾實也病苦腸中怵怵一作伏如牢狀大便難脈緊而滑直大便亦難附腸脈微弦法當腹滿不滿者必大便難而脚痛此虛寒從下而上也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云偃臥直兩手捻左右脇除大便難腹痛脹中寒口內氣鼻出氣溫氣咽之數十病愈

出第中

肘後療脾胃不和常患大便堅強難方 大黃 芍藥 厚朴二兩枳實六枚麻子別研右五味搗篩

入麻子蜜和為丸如梧桐子大每服十九日三服稍稍增之以通利為度可常將之集驗備急古今錄

千金療大便難方 灸承筋二穴三炷在臍中央陷中

古今錄驗療心腹脹滿大便不通方 芍藥六兩黃芩五兩大黃八兩芒硝六兩杏仁八分右五味搗篩為末

鍊蜜為丸如梧桐子大每服十五丸粥飲下加至二十九丸取通利為度經心錄同出第

近效療大便不通方 用豬膽和少蜜於鑊中熬令熟稠丸如棗大內下部中即差

大便秘澀不通方七首



尚德按膽字下千金有無擇二字宋本作無在蓋在字即拘字之訛例見第十一卷中

尚德按營病源作榮下並同

千金療大便秘澀不通神方 猪羊膽 右一味以筒灌三合許令深入即出矣不盡須臾更灌一方加

冬葵子汁和之又有椒豉湯五合猪膏三合灌之佳

經心錄同

又三黃湯療下焦熱結不得大方便方

大黃三兩 黃芩二兩 甘草二兩 一梔子二七

右四味切以水五升煮取

一升八合分三服若秘加芒硝二兩

並出第十卷中

備急療卒大便秘澀不通方 葛氏云削瓜瓠如指大導下部中即效

又方 燒亂髮灰三指捻投水半升一服

又方 綿裹鹽作三丸如指大內下部中

又方 煎蜜令強加乾薑末和丸如指導下部中姚云欲死者蜜三升微火煎如飴投冷水中令凝丸如

大指長三四寸導之良

又方 猪膽一枚內下部中姚云療七八日奔氣傷心欲死者須臾便通良

說注

大便秘禁並關格大小便不通方二十二首

病源大便秘禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛門大腸之候也俱主行糟粕既虛弱冷滑氣不能溫制故使大便秘禁

又關格大便秘不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱不通為關格也由陰陽氣不和榮衛不通故也

陰氣大盛陽氣不得營之曰內關陽氣太盛陰氣不得營之曰外格陰陽俱盛不得相營曰關格關格則

陰陽之氣痞結腹內脹滿氣不行於大小腸故關格而大小便不通也又風邪在三焦三焦約者則小腸

痛內閉大小便不通日不得前後而手足寒者為三陰俱逆三日死也診其脈來浮牢且滑直者不得大

小便也

並出第十卷中

范汪療下部閉不通方 取烏梅五顆著湯漬須臾出核取熟搗之如彈丸內下部中即通也

附後

又方 取胡蘆根一把搗末水和絞去滓強人服一升數用有效兼療脚氣



又療大小便不通三陽實大便不通方

榆白皮兩桂心二滑石六甘草三兩

右四味以水一斗煮取

三升分三服集驗同並出

集驗療關格之病腸中轉痛不得大小便一日一夜不差欲死方

芒硝三兩絃三重裹於炭火內燒令

沸安一升水中盡服之當先飲溫湯一二升以來吐出乃飲芒硝汁也附後

又方 單用豉清醬清羊酪土瓜根汁並單灌之立出范注

又練中丸主宿食不消大便難方

大黃八兩薤白去皮芒硝各四兩

右四味搗篩為末鍊蜜為丸

如桐子大每服十九日三服稍加之並出第十

備急不得大便或十日一月方 葵子二升水四升煮取一升去滓一服不愈重作服良忌蒜炙肉古驗

古今錄驗麻子仁丸療大便難小便利而反不渴者脾約方

麻仁二升別枳實肆斤芍藥肆斤大黃斤厚

朴炙一尺杏仁熟別為脂

右六味搗篩為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服飲下十九丸漸增至三十丸

日三服此本仲景傷寒論方

大便不通方一十七首

病源大便不通者由三焦五臟不和冷熱之氣不調熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕痞結擁塞不通

也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云龜行氣伏衣被中覆口鼻頭面正卧不

息九通微鼻出氣療閉塞不通出第十

肘後療大便不通方 研麻子以米雜為粥食之

又方 用礬石如指大者導下部並出第

千金療大便不通方 灸第七椎兩傍各一寸七壯

又方 桃皮三升水五升煮取一升頓服

通按礬石一本作礬石

尚德樓藥病源作鹽

尚德樓千金食後服七九



尚德按苗  
千金作葉

尚德按三  
千金作四

濕宋本作  
漢石鹽末下  
宋本有各  
一兩三小  
字

通按足大  
指本節後  
日政皆今  
云奇問當  
是岐間也

尚德按千  
金以水二  
升煮五沸  
尚德按千  
金分三服  
尚德按千  
金分二服

又方 水一升煮羊蹄根一把取半升頓服

又方 煮麻子取汁飲之

又方 當服蜜煎五合

又方 豬脂和陳葵子末為丸如梧桐子大每服飲下十九通即止

又方 常服車前子及苗並通也

又方 搗葵根汁服之良

又方 葵子一升牛酥一升豬脂亦得以水三升煮葵子取一升內酥煮一沸待冷分二服並出第十卷中

又方 必效療大便不通方 牛膠一條長四寸葱白握右二味用水二升和煮消盡去滓頓服之千金

又方 濕瓜蒂七枚綿裹內下部如非時醬瓜亦得並出第三卷中

崔氏療大便不通方方字下宋本有文 葛蒲末 石鹽末 右二味相和取半匕和烏麻脂少許綿裹

內下部中即通

又方 豬脂一升溫酒一服令盡良並出第四卷中

千金療老人小兒大便失禁方 灸兩脚大姆指去爪甲一寸三壯

又方 灸足大指奇間各三壯

又方 瘡大小便不通方 灸臍下一寸三壯

又方 灸橫文一百壯

又方 葵子升升竹葉 右二味以水一升煮一沸頓服之

又方 葵子升升榆白皮 右二味以水五升煮取二升分二服

又方 水三升煮葵子一升去滓取一升內猪膏一升空肚一服

又方 鹽半升合蜜三合同煎如飴出之著冷水中丸如指大深內下部中並通並出第十卷中

大便不通方一十七首 關格脹滿不通方四首



尚德接千  
金治大便  
不通鹽半  
合

通字下家  
本有秘方  
二字

尚德接吐  
去水三字  
疑當大書

尚德接千  
金飲服十  
五丸加至  
二十丸取  
通利為度

外臺秘要 卷二十一

千金翼濡藏湯主大小便不通六七日腹中有燥糞寒熱煩迫短氣汗出腹滿方 生葛根二斤 切 諸膏二

大黃切一兩 右三味以水七升煮取五升去滓內膏煎取三升澄清強人頓服之贏人分再服出第七

備急葛氏療卒關格大小便不通支滿欲死二三日則殺人方 鹽以苦酒和塗臍中乾又易之必效

陶氏卒大小便不通方 熱裏鹽燒投水中服之

姚氏風寒冷氣入腸急痛堅急如吹狀大小便不通或小腸有氣結如升大脹起名為關格病

又療大小便不利方 苦參 滑石 貝齒銘等 右三味搗篩為散每服飲下一匕或煮葵根汁服之

彌佳大仲同出 第六卷中

古今錄驗療關格大小便不通方 以水三升煮鹽三合使沸適寒溫以竹筒灌下部立通也

又療大小便不通方 通草四兩 郁李仁三兩 車前子五合 一黃芩三兩 朴硝四兩 瞿麥三兩 右六味切以水八

升煮取二升去滓分三服經心 同

又方 取生土瓜根搗取汁以水解之於筒中吹內下部即通並出第二 十六卷中

經心錄療關格大小便不通方 芒硝 烏梅 榆白皮各五兩 芍藥 杏仁去皮尖 麻子仁三兩 大黃八兩

右七味切以水七升煮取三升分為三服一方無烏梅加枳實乾地黄各二兩

又療大小便不通方 滑石二兩 葵子 榆白皮各一兩 右三味下篩為散煮麻子汁一升半取二匕和服

兩服即通並出第 二卷中

近效療大小便不通方 含硝石吐去 水

關格脹滿不通方四首 芍藥六兩 芒硝六兩 黃芩五兩 杏仁八分 去大黃八分 右五味末之蜜和丸如桐子

千金療關格脹滿不通方 飲下十九日二服良

又方 獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部氣立通割薑蔥鹽導並佳尚德接表鹽 千金作以鹽



日三  
尚應慎干  
金人參細  
辛各一兩  
真珠半兩  
本沸字  
下有旦字  
之字下有  
忌海藥  
菜生處生  
菜血物等  
十三字

利字下家  
有矣字

服字下家  
本有不和  
忌燕羹  
炙肉為參  
物粘食等

又方 乾薑 鹽 杏仁 右三味等分搗導之

又療脹滿關格不通方 吳茱萸一升 乾薑 大黃 桂心 當歸 芍藥 甘草炙 芎藭各二 雄黃三分

研人參 細半各四 真珠研一分 桃白皮握 右十三味切以水一斗煮取三升去滓內雄黃真珠末酒

一升微火煎三沸服一升得下即止不必盡也每服如人行十里久進之並出第十卷中

許仁則大便暴閉不通方二首

許仁則論曰此病久無餘候但由飲食將息過熱氣壅積秘結若緣氣秘自須仍前療氣法服已豆等

三味丸及療水氣蘼蘼等諸方取利若是風秘有依後服大黃等五味丸暴秘之狀骨內強痛體氣煩熱

唇口乾焦大便不通宜依後大黃芒硝二味湯取利方 大黃酤芒硝 右藥先切大黃以水四升煮

取二升去滓內芒硝頓服之須臾利良久不覺以熱飲投之若服此依前不利宜合後大麻仁等五味

丸服之取快利

五味大黃丸方 大黃五 大麻子一升 芒硝六 乾葛 桑根白皮各五 右五味先搗四味為散然後

搗麻仁令如膏即投四味散和搗和少蜜搗之丸如梧子大初服十丸日再服稍稍服得大便通為限

主大便風秘不通吳昇同出下卷中

小便不通方一十三首

病源小便不通由膀胱與腎俱有熱故也腎主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於小腸入胞

者為小便腎與膀胱既熱熱入於胞熱氣大盛故結澀令小便不通少腹脹氣急甚者水氣上逆令心急

腹滿乃至於死診其脈緊而滑直者不得小便也出第十卷中

廣濟療下冷疼小便不通雞蘇飲子方 雞蘇握 通草四 石葦一兩 炙冬葵子半 杏仁二兩 滑石二

生地黃四 右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服如人行四五里進一服

又方 冬葵子五 通草三 茅根四 芒硝二兩 茯苓三 滑石五 右六味切以水九升煮取三升去滓內

小便不通方一十三首 小便難及不利方九首



十八字  
里字下宋  
本有忌食  
肉熱食醋  
葱等物九  
得字下宋  
本有忌酢  
物桃李雀  
肉等八字

通字下木  
本有或利  
二字

芒硝分溫三服服別相去如人行六七里

又方 茯苓分二 大黃分六 芍藥 當歸 枳實 白木 人參各二 大麻仁分四 右八味切以水六升煮取

二升去滓分溫三服要著芒硝亦得並出得四卷中

崔氏療小便不通方 取重黃如豆許末之內小孔中神良

又方 桑根白皮 豬苓去通草 右三味切以水六升煮取二升分三服

又方 雞屎白如彈丸以苦酒和服即下不過三四服佳一本云

又方 足大姆指奇間有青脈鍼挑血出矣三壯愈並出第

救急主小便不通方 取印成鹽七顆擣碎作末用青葱葉尖盛鹽末開便孔內葉小頭於中吹之令鹽

末入孔即通非常之效

又方 取嫩穀木梢濃汁可飲半升以來即愈

必效療小便不通不得服滑藥急悶欲絕方 鹽二升大鑊中熬以布綿裹熨臍下按之小便當漸通也

附後

古今錄驗療熱結小便不通利方 刮滑石屑水和塗少腹及繞陰際乾復塗之附後

又方 取鹽填滿臍中大作艾炷灸令熱為度良附後千金同並出第二十六卷中

近效療小便不通數而微腫方 取陳久筆頭燒作灰和水服之

小便難及不利方九首

病源小便難者此是腎與膀胱熱故也此二經為表裏俱主水水行於小腸八胞為小便熱氣在於臟腑

水氣則澀其熱勢微故但小便難也診其尺脈浮小便難尺脈濡小便難尺脈緩故小便難有餘滲也出

卷十四

集驗療小便難淋瀝湯方 滑石八兩 石葦三兩 榆皮升 葵子升 通草兩 右五味切以水一斗煮取三升



尚德按千金通草茯苓各三兩薤白二兩

分三服一方加黃芩三兩

又療淋小便不利陰痛石葦散方

石葦二兩去毛瞿麥一兩滑石五兩車前子三兩葵子二兩

右五味搗篩為散服

方寸匕日三並出第五卷中

千金療小便不利莖中痛少腹急方

通草二兩薤白三兩茯苓二兩

右三味搗為散以水服方寸匕日

三服忌醋物出第二十卷中

備急療小便不利莖中痛劇亦療婦人血結腹堅痛牛膝飲方

生牛膝一名牛唇掘取根煮服之立差

同肘後

陶效方 秦先紅冬瓜子二兩

右二味搗為末酒服一匕日三服神良

同肘後

文仲療小便不利分

桑螵蛸一枚黃芩一兩

右二味切以水一升煮取四合頓服之良

同肘後

又方 蒲黃 滑石各一兩

右二味為散酒服一匕日三大驗

同肘後

又療諸淋及小便常不利陰中痛日數十度起此皆勞損虛熱所致常將散服方

石葦去毛滑石 瞿麥

王不留行

葵子各二兩

右六味搗篩為散每服方寸匕日三服之姚方加滑石五兩車前子三兩無

王不留行

備急同出第四卷中

古今錄驗療淋胞痛不得小便滑石散方

滑石 葵子 鍾乳各一兩桂心

通草 王不留行各半

右六味搗篩為散先食訖以酒服方寸匕日三服忌生葱

出第二十卷中

遺尿方六首

病源遺尿者此由膀胱虛冷不能約於水故也膀胱為足太陽腎為足少陰二經為表裏腎主水腎氣下通於陰小便者水液之餘也膀胱為津液之府府既虛冷陽氣衰弱不能約於水故令遺尿也診其脈來過寸口入魚遺尿肝脈微滑亦遺尿左手關上脈沉為陰絕者無汗脈也若遺尿尺脈實少腹半痛小便不禁尺中虛小便不禁腎病小便不禁脈當沉滑而反浮大其色當黑反黃此土之剋水為逆不治其湯

通按左手關上肝脈是無汗當



尚德按病源魚字下有陰字汗作肝趾作指

尚德按千金防風二兩

尚德按各字疑衍

尚德按千金方酒服

外臺方

熨鐵石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝至跌上急手

握足五趾極力一通令內曲以利腰臍瘳遺尿也出第十卷中

集驗瘳遺尿方 取雄雞腸燒灰為末用三指一撮服之朝暮服當愈汪同出第五卷中

千金瘳遺尿小便澀方 壯蠟熟鹿茸炙各四兩桑耳三兩阿膠炙二兩 右四味切以水七升煮取二升分為二

服作散以飲送之經心

又方 木防已二兩葵子二兩防風三兩 右三味切以水五升煎取二升半分溫三服作散亦佳古今錄驗同

一卷

古今錄驗壯蠟湯瘳遺尿小便澀方 壯蠟熟鹿茸炙各四兩阿膠炙桑螵蛸各二兩 右四味切以水五升煮

取二升分再服

又方 桑耳三分礬石二分阿膠二分龍骨炙 右四味為散空心服方寸匕日三服

又方 桑耳二兩壯蠟三兩礬石二兩 右三味搗篩為散酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

尿血方一十一首

千金瘳房損傷中尿血方 壯蠟熟車前子 桂心 黃芩 右四味等分搗篩為散飲服方寸匕日三

服不知加至二匕忌生葱出第二十卷中

崔氏瘳卒傷熱行來尿血方 大黃末芒硝末 右二味冷水和頓服立止三日內禁如藥法出第四卷中

古今錄驗瘳尿血鹿茸散方 鹿茸炙當歸 乾地黄各二兩 桑子五兩蒲黃五兩 右五味搗篩為散酒服方

寸匕日三服忌蕪荑出第二十卷中

蘇澄瘳尿血方 車前草搗絞取汁五合空腹服之差

又方 水服亂髮灰方寸匕日三服肘後千金同

又方 服益母草汁一升差一云律草



通按自膠  
阿膠皆主  
尿血黃明  
膠亦主血  
淋不知此  
用何味  
通接尿血  
方中有用  
水并汁者  
此云水筋  
疑誤

尚德按病  
源機作雙  
因急作急

已字下宋  
本有三字

通按在夫  
作在參

尚德按黑  
疑當作星

又方 車前三升水五升煮取二升分三服

又方 棘刺二升水三升煮取二升分三服差

又方 膠三兩炙以水二升煮取一升四合分再服

又方 酒服蒲黃二方寸匕日二服水服亦得

又方 搗水筋汁服六七合日一服

### 胞轉方一十五首

病源胞轉者由是胞屈辟小便不通名為胞轉其病狀臍下急痛小便不通是也此病或由小便應下強忍之或為寒熱所迫此二者俱令水氣上逆氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內沒應出不得出外內相擁塞故令不通此病至四五日乃有致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便因急奔走或忍尿入房亦皆令胞轉或胞落並致死

出第十卷中

肘後療卒小便不通及胞轉方 取雞子中黃一枚服之不過三服佳

備急同

又方 水上浮萍暴乾末服之小便不通利水脈流腫佳

千金翼同

又方 灸桑螵蛸搗為末水服之方寸匕日服良效

又療小便忍久致胞轉方 自取爪甲火燒服之

備急同

又方 取梁上塵三指撮以水服之神效

又方 服蒲黃方寸匕日三服良

范汪療胞轉不得小便方 用蒲席捲人倒立令頭至地三反則通

肘後同

又方 雀矢合車前子 滑石各四兩 通草 芍藥各二兩 右五味切以水七升煮取三升服五合日三先

### 食服立愈

又療胞轉欲死及失溺方 取豆醬清和龜突中黑如豆大肉陰孔中立愈

並出第十卷中



備急療卒小便不通及胞轉方 車前草一斤水一斗煮取四升分四服小品同出

古今錄驗療胞轉小便不通亂髮散方 亂髮三斤洗滑石半斤鯉魚齒兩 右三味搗篩為散以飲服方

寸七日三服良

又療胞轉不得小便方 真琥珀兩葱白十四 右二味以水四升煮取三升去葱白末琥珀細篩下湯

中溫服一升日三服佳說注

又張苗說有容忍小便令胞轉大小便不得四五日困篤欲死無脈服此差方 滑石二兩亂髮三兩 右

二味搗下篩取生桃白皮一斤熟舂以水合絞得汁二升以汁服散方寸七日三服即愈其但淋者取

亂髮三兩燒灰滑石五兩合搗為散服方寸七日三服

又說不得小便者為胞轉或為寒熱氣所迫肥屈辟不得充張津液不入其中為尿及在胞中尿不出方

當以蔥葉除尖頭內入莖孔中吹之初漸漸以極大吹之令氣入胞中津液入便愈也米郁用此藥療

郭虎將十五歲男用 葵子升通草 甘草各二兩石葦一兩半滑石四兩榆皮二升 右六味以水一斗煮

取三升令服說注同並出第

小便血及九竅出血方一十二首

小品療小便血菟絲丸方 菟絲子 蒲黃 乾地黄 白芷 荊實 葵子 敗醬 當歸 茯苓

芍藥各二 右十味合搗為末以白蜜和丸如梧子大飲服二九日三服不知加至五六九劉洪記方

已效常服忌酢物蘆薈說注 錄驗

又斷血諸方所云下血者其從腹裏出者悉為下血也有痔病血從孔邊出者別尋痔方出第四

千金療小便出血方一本云以下治 灸脾俞百壯在第十椎

又方 灸三焦俞百壯在第十三椎

又方 灸腎俞百壯在第十四椎

真字上宋  
本有吸本  
二字  
宋本說字  
下有土程  
妻三字容  
作容

尚德按初  
脫字疑有  
又按朱郁  
別揭  
以下疑當

通接脾俞  
在十一椎  
今云十椎  
誤矣



升字下米  
本有分十  
服三字

尚德按十  
金黃芩二  
兩以水八

升煮  
此法以下  
十二字宋

本大書

尚德按葉

字下千金

莫有多字

宋本同

枚千金翼

作兩

通按硝石

疑是滑石

八味疑有

又方 炙章門百壯在季肋端

又方 榆皮二斤水二斗煮取五升令服之佳

又方 檮乾半骨下篩水服方寸匕日三服

又治小便血方 生地黃兩柏葉把黃芩兩阿膠兩 右四味切以水七升煮取三升去滓內膠分三服

並出第二  
十一卷中

文仲療小便出血方 生地黃汁升生薑汁合 右二味相和頓服不差更作 此法許令公處

又方 灸足第二指本第一文七壯立愈 附後

又方 龍骨末二方寸匕溫酒一升服之日三服 添師附後范

又方 當歸四兩酒三升煮取一升頓服之 附後深師范汪同

小便不禁方二首

病源小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主水其氣下通於陰腎虛下焦冷不能溫制其水液故小便不

禁也 出第十  
四卷中

千金療小便不禁日便一二斗或如血色方 麥門冬法乾地黃各八錢藜子 桂心 續斷各二甘草

一 枚 乾薑兩 右七味以水一斗煮取二升五合分三服 服字下宋本有忌海藻

又久房散主小便多或不禁方 尚德按十金翼久作九菟絲子三兩無五 范絲子二兩蒲黃 黃連各

兩硝石一兩從蓉兩五味子 雞臍腔中黃芩兩各三 右八味擣篩為散每服方寸匕日三服每服如

人行三四里又服 並出第十五卷中 又按十金翼用硝石本無可異者未審散通何由疑其

病源小便數者膀胱與腎俱虛而有客熱乘之故也腎與膀胱為表裏俱主水腎氣下通於陰此經既虛

致受於客熱虛則不能制水故令數小便熱則水行溫溫則小便不快故令數起也診其脈跗陽脈數胃



尚德按歌  
病源作歌

外臺祕要

卷二十七

小便不禁方二首  
許仁則小便數多方四首

十一

中有熱即消穀引食大便必鞭小便則數其湯對鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云

以兩踵布膝除數尿

出第十卷中

范汪療小便數而多方

黃連

苦參

麥門冬

去心  
兩  
土瓜根

龍膽

右五味搗篩以蜜丸如

梧子每服十丸加至二十丸良

一方無苦參有黃芩

又方 栝蒌汁黃連

右二味搗篩為散每服方寸匕日三良

又方 瞿麥二滑石兩

葵子升黃芩

甘草炙

右五味切以水六升煮取三升去滓一服六合

又方 桃仁一味

咬咀酒一升煮三沸去滓分為三服強人服盡之

並出第十卷中

集驗療小便數而多方

羊肺羹內少許羊肉合作之調和鹽如常食之法多少任意不過三具效

第五卷中

許仁則小便數多方四首

許仁則論此病有二種一者小便多而渴飲食漸加肌肉漸減乏氣力少顏色此是消渴一者小便雖數而不至多又不渴飲食亦不異常或不至多能食但稍遇天寒冷即小便多更無別候此是虛冷所致大都兩種俱緣腎氣膀胱冷不差便能殺人腎虛腰冷無所為害若候知是消渴小便數宜依後按藥等八味湯黃耆等十四味丸并竹根等十味飲小麥麵等十四味煎以次服之

按藥八味湯方

按藥

土瓜根

三黃耆

地骨皮

五味子

右藥

切以水一斗煮取三升去滓分溫三服每服如人行十里服一劑服至五六劑佳隔五日服一劑劑數

滿宜合後黃耆等十四味丸服之

又黃耆十四味丸方

黃耆

黃連

土瓜根

苦參

麥門冬

栝蒌

草

略壯蠟

人參

桑螵蛸

五味子

右藥搗篩為末蜜和為丸用後竹根飲下之初服十

五丸日二服稍加至三十丸如梧桐子大忌豬肉冷水



宋本無此  
一行九字  
宋本小字  
上有又字  
麥字下有  
麵字  
尚德按一  
片疑當作  
一半  
中字下宋  
本有方中  
只十三味  
元欠一味  
十字

又竹根飲子方

薑竹根

生茅根

蘆根

石膏

生薑

小麥

三竹瀝

升白蜜升

右藥以水五斗煮取一斗去滓內竹瀝及蜜著不津瓶貯之用下前丸縱不下丸但覺口

乾及渴即飲之如熱月即逐日斟酌煎之多則惡壞也如不能作此飲且用烏牛乳下丸及解渴日服

丸及飲夜中恐虛熱宜合後小麥麴等十四味者細細含嚥之

又小麥麴十四味煎方

小麥五升以水硬漉之別於水中揉挺令麵粉盡麵筋別成一塊即止以此麵

粉汁別器澄停漚却清汁即以稠粉盛於練褌子中漉著令微燥生葛根五挺徑三寸長二尺碎挺於

水中揉挺合葛根中粉汁盡別器澄停盛貯一如小麥麴法生枯薑五斤搗如上法胡麻三升去皮熬

令熟為散薑竹根切一斤生茅根切一斤生蘆根切一斤烏梅五十個以上用水五斗緩火煎取一升

半去滓澄取清冬瓜汁二升生麥門冬汁三升生薑汁一升牛乳一升白蜜二升先取竹根等汁和冬

瓜以下汁微火上煮減半次內牛乳白蜜又煎六七沸投小麥麵粉生葛粉枯薑粉胡麻散於諸汁中

煎和熟攪之勿住手候如稠糖即成成訖止火待冷貯別器中每夜含如此初服一棗大稍稍加至一

匙亦任性日日含之欲作丸飲服亦得

卷第十

尿尿方六首

病源人有於眠睡不覺尿出者是其稟質陰氣偏盛陽氣偏虛則膀胱腎氣俱冷不能溫制於水則小便

多或不禁而遺尿膀胱足太陽也為腎之府腎為足少陰為藏與膀胱合俱主水凡人之陰陽日入而陽

氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則臥睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞為小便夜臥則陽氣

衰伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於眠睡而不覺尿出也

出第十  
四卷中

千金療尿床方

羊肚系盛水令滿急繫兩頭熟煮開取水頓服之立差

又方

雞臍脰一具并腸暴乾末酒服之男雌女雄也

又方

羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉晨朝空腹服之不過四五頓差

羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉晨朝空腹服之不過四五頓差

羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉晨朝空腹服之不過四五頓差

羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉晨朝空腹服之不過四五頓差

羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉晨朝空腹服之不過四五頓差



尚能按熱  
清飯千金  
作熱飯宋  
本作熱清  
飯宋本作  
鹽

又療尿牀方 新收熟漬飯一盞瀉尿牀處拌之收取與食之勿令知

又方 垂兩手髀上盡指陷處灸七壯又灸臍橫文七壯並出第十二卷中

近效療尿牀方 取麻鞋乳帶及鼻根等唯不用底須七輒以水七升煮取二升分再服

灸穴雜法一十二首

千金翼灸五淋法 灸大敦三十壯

又石淋臍下三十六種疾不得小便法 灸關元三十壯一方云百壯

又血淋法 灸丹田穴隨年壯良

又方 灸復溜穴五十壯一云隨年壯

又尿黃法 灸石門穴五十壯

又遺尿法 灸遺道俠玉泉五寸隨年壯

又法 灸陽陵泉穴隨年壯

又失禁尿不自覺知法 灸陰陵泉穴隨年壯

又莖中痛法 灸行間穴三十壯

又腹滿小便數法 灸屈骨端二七壯

又淋痛法 灸中封穴三十壯亦隨年壯

又小便不利及轉胞法 灸心下八寸七壯以上穴並出第二十七卷中



尚德桂今  
有方九首

唐王燾先生外臺秘要方卷二十八目錄

中惡蠱注自蠱  
溺死凍死一十八門

中惡方一十三首

卒死方二十四首

客忤方一十三首

卒魔方二十一首

鬼擊方一十首

尸厥方一十二首

中蠱毒方二十一首

蠱吐血方一十首

蠱下血方九首

五蠱方一十二首

蠱注方三首

蠱毒雜療方五首

猶鬼野道方三首

自縊死方一十五首

熱暈方七首

溺死方九首

凍死方一首

人井塚閭方二首







唐王燾先生外臺秘要方卷二十八

宋朝 散大夫字光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安 後學 程衍道 敬通 父訂 梓

中惡方一十三首

病源中惡者是人精神衰弱為鬼邪之氣卒中之也夫人陰陽順理榮衛調平神守則強邪不干正若將  
攝失宜精神衰弱便中鬼毒之氣其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脈緊大而  
浮者死緊細而微者生又中惡吐血數升脈沉數細者死浮者生如疾者生中惡有差後餘勢停滯發作則  
變成症

通按發音  
尚德按有  
病源作者

又中惡死候中鬼邪之氣卒然心腹絞痛悶絕此是客邪暴感陰陽為之離絕上下不通故氣暴厥絕如  
死良久其真氣復則生也而有乘年之衰逢月之空失時之和謂之三虛三虛而腑臟衰弱精神微羸中  
之則真氣竭絕則死也其得差者若餘勢停滯發作則變成症並出第三卷中

廣濟療卒中惡心腹刺痛去惡氣方麝香研一分青木香仁生犀角屑二分右三味為散空心熟水服方寸

匕日二立效未止更作忌如常法出第四卷中肘後華佗療中惡短氣欲絕方 灸兩足大拇指上甲後聚毛中各灸二七壯即愈又法三七壯集驗方

同急

又方 杏仁七十枚桂心二兩甘草一兩麻黃三兩去節右四味切以水八升煮取三升分三服含嚥之

通療諸客忤良忌如常法如常法米本作海藻生葱蒜菜等物八字

又方 韭根把烏梅酢菜羹右三味切以勞水一升煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者死

煮取三升飲之大效

又方 桂心兩生薑三兩梔子十四枚豉五合右四味搗碎以酒二升微煮之去滓頓服之取吐為度並出第一卷中

尚德按肘  
後無桂心  
尚德按肘  
後烏梅二  
十箇羹  
半斤以水  
一斗煮  
尚德按肘



後用酒三升  
作字下宋  
本有強字  
高德按  
出字下疑  
服第字  
握宋本作

胡豆大五  
屎字下宋  
本有新故  
並得一物  
若新八字  
宋本云取  
真珠書古  
作鬼字額  
上亦書之  
大良  
高德按  
病源作壅

集驗療中惡遁尸心腹及身體有痛處甚者短氣不語手摸按之得其痛處則病色動惡人近則是痛處

方 取艾葉按碎著痛上厚寸餘鑄中煮湯和灰作泥令執薄艾上冷輒易之不過再著則愈出中

又療中惡心痛胸脅痛喘急湯方 桃東行枝白皮推真珠兩梔子仁樹四生薑二當歸桂心各三

附子炮兩香豉各五吳茱萸各五右九味切以水八升煮取二升去滓內真珠分二服忘如常法同

又方 仰臥以物塞兩耳以兩箇竹筒內死人鼻中使兩人痛吹之塞口傍無冷氣得出半日所死人即

噫噫勿復吹也千金同又按鼻中千金作口中

又方 痔瘡炎細辛屑吹兩鼻孔中單用皂莢末亦佳千金同並出卷中

刪繁療中惡痛欲絕方 釜底墨五鹽一撮 右二味和研以水一升攪調一服范汪同並出第

又方 牛屎絞取汁五合為一服口不開扣齒內藥若無新者乾者即以水和取汁並出第

崔氏療卒中惡氣絕方 取真珠研末書鬼字於舌上額上亦書鬼字驗

又方 灸右肩高骨上隨年壯並出第

卒死方二十四首

病源卒死者由三虛而遇賊風所為也三虛謂乘年之衰一也乘月之空二也失時之和三也人有此三

虛而為賊風所傷使陰氣偏竭於內則陽氣阻隔於外二氣擁閉致暴絕如死也若腑臟氣未絕者良久

乃蘇然亦有挾鬼神之氣而卒死者皆有頃邪退乃活也凡中惡及卒忤卒然氣絕其後得蘇若其邪氣

不盡者停滯心腹或心腹痛或身體沉重不能飲食而成宿軫者皆變成症

又卒忤死候犯卒忤客邪鬼氣卒急傷人入於腑臟使陰陽離絕氣血暴不通流奄然厥絕如死狀也良

久陰陽之氣和乃蘇若腑臟虛弱者死亦有雖蘇而毒氣不盡時發即心腹刺痛連滯變成症也並出第

甲乙經云黃帝問於歧伯有卒死者何邪使然答曰得三虛者暴疾而死得三實者邪不能傷也黃帝曰



仆字下宋  
本有倒仆  
肘後作瘕  
肘後小字  
刺鼻以下  
七字宋本  
作中央心  
刺鼻令入  
七寸無  
若十二字  
宋本兩耳  
下有極則  
易入四字  
吹之下有  
並捧其肩  
上側身送  
之莫臨死  
人上十四  
字

顧聞三虛答曰乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所傷也顧聞三實答曰逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能傷也有卒死不知人有復生何氣使然陰氣先竭陽氣未入故卒死而不知人氣復則生

集驗同出  
第六卷中

肘後云卒死中惡及尸厥者皆天地及人身自然陰陽之氣有乖離否隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶可療而生緣氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於其間故亦可以符術護濟者

又卒死或先有病痛或居常倒仆奄忽而絕皆是中惡之類療方 取葱刺鼻令入數寸須使目中血出乃佳 一云耳中血出佳此扁鵲法同後云吹耳中葛氏吹鼻別為一法

肘後集驗備急文仲必效等同  
崔氏亦療中惡尚捷按此以下

七方引肘後而注並云肘  
後同可疑 後宋本作葛

又方 令二人以衣壅口吹其兩耳亦可以葦筒吹之

肘後

又方 以葱刺耳耳中鼻中血出者勿怪無血難療之有血者是活候也其欲蘇時當捧兩手莫放之須臾死人目當舉手揚人言痛乃止男刺左鼻女刺右鼻孔令入七寸餘無苦立效亦療自縊死此扁鵲

法 肘後集驗備急同  
目宋本作自

又方 視其上唇裏弦有青息肉如黍米大以針決去之

肘後

又方 以小便灌其面數過即能活扁鵲法也

肘後集驗備急同  
文仲備急同

又方 以綿漬好酒內鼻中手按令汁入鼻中並持其手足莫令驚動也

肘後

又方 灸其脊下宛宛中名承漿十壯大良

肘後同並出  
第一卷中

文仲療卒死方 濕牛馬糞絞取汁以灌其口中令入喉若口已噤者以物強發若不可強發者扣折齒

下之若無新者以水若人尿和乾者絞取汁扁鵲法

集驗備急  
肘後同

又方 以細繩圍其人肘腕中男左女右伸繩從背上大椎度以下行脊上灸繩頭十壯

云五

又從此灸橫

行各半繩此凡三灸各灸三壯即起

卒死方二十四首



又方 令人痛爪其人入中取醒不起者捲其手灸下文頭隨年壯

又方 灸鼻下人中三壯

又方 灸臍中百壯

又方 半夏末如大豆許吹鼻中

又方 搗薤若韭取汁以灌口鼻中張文仲集驗范汪同

又方 猪膏如雞子大苦酒一升煮沸灌喉中集驗肝後備急同

又方 卒死而壯熱者方 磐石半斤者以漬脚令沒踝附後范汪同並出第一卷中

備急療卒死而目閉者方 騎牛臨其面搗薤汁灌耳中末皂莢吹鼻中集驗文仲附微范汪同

又療卒死而張目反折者方 灸手足兩爪甲後各十四壯飲以五毒諸膏散有巴豆者良附後張文仲同

又療卒死而四肢不收失便者方 馬屎一升水三斗煮取二斗以洗足又取牛糞一升溫酒和灌口中附後

又方 灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各百壯良附後同

又卒死而口噤不開者方 縛兩手大姆指灸兩白肉中二十壯附後文仲范汪同並出第一卷中

集驗療卒死無脈無他形候陰陽俱竭故也方 牽牛臨鼻上二百息又灸臆斗以熨兩脇下鍼兩間使

各百餘息灸人中

又療卒死而有脈形候陰氣先盡陽氣後竭故也方 嚼薤哺灌之附後文仲千金范汪同並出第一卷中

古今錄驗司空三物備急散療卒死及感忤口噤不開者方 巴頭去心皮熬乾薑 大黃各等分 右學搗篩

為散服如大豆許二枚以水三合和之腹脹煩熱飲水能多益佳

又療心腹痛幾死服此丸令小刺差如腹常滿痛當令得下差一方服一刀圭以酒下之不能刀圭者便

丸如大豆許四枚不知復加一豆許不差又加一豆許若病者口噤不能自飲撮口含之藥不預合預合

宋本此條與上方後一條痛幾

尚德樓頭疑當作豆



死服作病  
活死人令  
字下有得  
字利差作

能字下並  
有字如字  
字下有煩  
史二字極

作極  
尚德按療  
即治源作

氣字下宋  
本有思達  
觸之其氣

有哀歎故  
不能害人  
如自然惡

氣十九字  
尚德按令  
字上肘後

有翻字宋  
本同  
尚德按肘

後取茅草  
作稍稍少  
許第五字

草盡作第  
盡本宋同

客忤方一十三首

出第四  
卷中

氣力歇卒病者便令之無白木杯中擣耳不過三服取利無不差者蜜丸尤良

病源卒忤者亦名客忤謂邪客之氣卒犯忤人精神也此是鬼厲之毒氣中惡之類也人有魂魄衰弱者

則為鬼氣所犯忤喜於道間門外得之其狀心腹絞痛脹滿氣衝心胸或即悶絕不復識人肉色變異臍

臟虛竭者不療即至於死然其毒氣有輕重輕者微療而差重者侵尅腑臟雖當時救療餘氣停滯久後

猶發乃變成症出第二十三卷中

肘後論曰客者客氣也忤者犯也謂客氣忽犯人也此惡鬼毒厲之氣療之多愈亦有侵尅臟腑經絡雖

差後猶宜治療以消餘勢不爾終為人患有時輒發

又客忤死者中惡之類也喜於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不即療亦殺人方 灸鼻

下人中三十壯愈備急大

又方 以水漬粳米取汁二升以飲之口已噤者以物強發之

又方 以銅器瓦器盛熱湯器著腹上冷者徹去衣器觀肉大冷者易以熱湯取愈也

又方 先以衣三重藉腹上以銅器著衣上取茅草於器中燒之草盡再益勿頓多也取愈乃止備急大

又方 以繩橫其人口以度度臍四面各一處灸三壯令大俱起也

又方 橫度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯也並出神

又療客忤心腹絞痛脹滿氣衝心胸煩躁壯熱或氣悶絞刺鬼魅之氣未散方 麝香錢茯神 人參

天門冬心法鬼白 葛蒲等 右六味蜜丸如桐子服十九日三

文仲扁鵲療客忤有救卒死符並服鹽湯法恐非庸世所能用故不載而此病即今人所謂中惡者與卒

死鬼擊亦相類焉療皆參取而用之已死者方 擣生葛蒲根絞取汁含之即愈備急大

又療卒忤停尸不能言者方 燒桔梗二枚末飲服之

小臺必要 卷一十三首 卒療方二十一首



又方 細辛 桂心 各等 右二味內口中

肘後備急同

又卒忤口噤不開者方 生附子末置管中吹內舌下

備急肘後同並出第一卷中

千金瘳容忤惡氣方

吞麝香如大豆立驗

出第五卷中

千金翼容忤方

灸間使七壯又肩井百壯又十指甲下各三壯

出第二十卷中

卒魔方二十一首

病源卒魔者屈也謂夢裏為鬼邪之所魔屈也人卧不寤皆魂魄外遊為他邪所執錄欲遂未得致成魔也忌火照火照則魂魄遂復入乃至於死而人有於燈光前魔者本由明出所以不忘火也其湯熨針石別有正方補養宣導令附於後養生方導引法云拘魂門制魄戶名曰握固法屈大拇指着四小指內抱之積習不止眠時亦不復開令人不魔魅又云人魔忽然明喚之魔死宜聞喚之好唯得遂喚亦不得近而急喚亦喜失魂魄也又魔不寤候人眠睡則魂魄外遊為鬼邪所魔屈其精神弱者魔則久不得寤乃至氣暴絕所以須傍人助喚並以方術療之即蘇也

並出第二十三卷中

肘後療卒魔寐不寤方 卧忽不寤勿以火照之殺人但痛齧其脚腫及足拇指甲際而多唾其面則覺也

又方 皂莢末以竹筒吹兩鼻孔中即起三兩日猶可吹之也

又方 以筆毛刺兩鼻孔男左女右展轉進之取起也

集驗

又方 搗雞取汁吹兩鼻孔冬日取韭絞汁灌口

集驗仲景文仲備急同

又方 以蘆管吹兩耳並取其人髮二七莖作繩內鼻孔中割雄雞冠取血以管吹喉咽中大良

並出第一卷中

集驗療卒魔方 以鹽湯飲之多少任意並齧其足大指爪際痛嚙之即起也

肘後文仲備急同

又方 以其人置地取利刀畫從肩起男左女右盡地令周過訖以刀鋒刺病人鼻下人中令人一分急

持勿動其人當鬼語求去乃具問阿誰以何故來自當乞去也乃以指滅向所畫地當肩頭數寸令得

尚德按急然病源作勿嫌

尚德按肘後無則人殺三字又按去字下宋本有



不可具詰  
問之矣  
字附後同  
但不可作  
作也

去

又方 雄黃細篩管吹兩鼻孔中佳並出第

崔氏主卒魔方 以甌帶在索縛其肘後男左女右用餘猶急絞之又縛牀脚乃詰問其故附錄古今

崔氏云療卒狂鬼語方以甌帶急令縛兩手大指使灸左右脇下屈肘頭尖各七壯須臾鬼語自道姓

名乞去徐詰問乃解其手

大仲療卒魔方 令一人坐頭邊守一人於戶外呼病人姓名坐人應曰在便甕活也附後

又人喜魔及惡夢者方以下並取燒死人灰著履中令枕之

又方 帶雄黃男左女右也

又方 枕麝香一分於頭邊佳又灌香少許

又方 以虎頭為枕佳

又方 取雄黃如棗核繫左腋下令人終身不魔也集驗

又方 作犀角枕佳

又方 青木香內枕中并帶之亦佳並出第

千金小定心湯療虛羸心氣驚弱多魔方 茯神四分一本甘草 芍藥 乾薑 大棗十五枚遠志去心人

參 桂心各二 右八味切以水八升煮取三升分三服日三忌如常法

又大定心湯療心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚魔志少不足方 人參 茯苓 茯神 遠志去心赤石脂

龍骨 乾薑 當歸 甘草 炙白朮 芍藥 大棗 桂心 防風 紫菀各二 右十五味切以水

一斗二升煮取三升半分為五服日三夜二忌如常法

千金翼療卒魔不覺方 灸兩足大指聚毛中二十一壯並汪同出第

備急療卒魔不寤方 末竈下黃土或雄黃桂心末亦得 右以蘆管吹入兩鼻孔中文仲同出

尚德按千  
金茯苓四  
兩甘草芍  
藥乾薑各  
二兩桂心  
三兩分四  
服日三服



通按此門  
只九方內  
缺一方

尚德按因  
病源作因

宋本同

尚德按陰  
字下肝後

有取字宋  
本同

尚德按肝  
後用酒酒

尚德按至  
肝後作笑

通按現機  
竅二音男

丑也擺音  
拜上聲損

皆瑣擊也

鑿宋本作  
鑿

入宋下宋  
本有方字

鬼擊一十首

尚德按擊字  
下厥脫方字

病源鬼擊者謂鬼厲之氣擊著於人也得之無漸卒著如人以刀矛刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名為鬼排言鬼排觸於人也氣血虛弱精魂衰微忽與鬼神遇相觸突致之為其所排擊輕者因而獲免重者多死也

出第二十  
三卷中

肘後鬼擊之病得之無漸卒著如人以刀矛刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名鬼排治之方灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際差

千金

又方熟艾如鴨子大三枚以水五升煮取二升頓服之

並出第  
一卷中

又方粉一撮於水中攪飲之

備急肘  
後同

又方以瀉苦酒吹令人兩鼻孔中

肘後同並出  
第一卷中

備急瘳鬼擊方燒鼠至末如黍米許水和服不能飲以水和少許內喉中

肘後文  
仲同

又方升麻獨活桂心各等

右三味為末酒服方寸匕立愈

又有諸丸散並在備急條中今並現實見人忽被神鬼所擊刺攢損者或犯其行伍或過相觸突或身神

散弱或愆負所招輕者獲免重者多死猶如周宣燕簡盡事不為虛也必應死者亦不可瘳要自不得不

救之耳

肘後同並出  
第一卷中

刪繁倉公散方特生礬石

燒研皂莢煨去雄黃研藜蘆熱

右四味等分搗為末主瘳卒鬼擊鬼排鬼

刺心腹痛下血便死不知人及臥壓嚙腳踵不覺者諸惡毒氣病取前散如大豆許以管吹入鼻中得

嚏則氣通便活若未嚏復更吹之得嚏為度此藥能起死人漢文帝太倉令瀉子意以此方瘳如前病

勝餘方若別疾不若玉壺丸等法

崔氏備急范汪等  
同出第六卷中

千金翼瘳鬼擊方灸臍下一寸三壯

出第二十  
七卷中



尸厥方一十二首

尚德按病  
源陰陽俱  
虛下者有  
字按字下  
有尸厥二  
字宋本同

尚德按要  
略無此字

尚德按此  
疑當作虛  
肘後作虛

尚德按肉  
肘後作肉  
尚德按肘  
後云灸臍  
中穴二十  
八壯

病源尸厥者陰氣逆也此由陽脈卒下墜陰脈卒上升陰陽離居榮衛不通真氣厥亂客邪乘之其狀如死猶微有息而不常脈尚動而形無知也聽其耳內循循有如嘯之聲而股間暖者是也耳內雖無嘯聲而脈動者故當以尸厥療之診其寸口脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏身溫而汗此為入腑雖卒厥不知人氣復則自愈若脣正青身冷此為入臟亦卒厥不知人即死候其左手關上脈陰陽俱虛足厥陰足少陽俱虛也病若恍惚不知人妄有所見觀字下宋本有也出

下

又方 取左角髮方寸匕燒末酒和灌令入喉立起

肘後方 白馬尾二七莖白馬前脚甲二枚燒之以苦酒丸如小豆大開口吞二九須臾服一九

又方 灸鼻人中七壯又灸陰囊下去下部一寸百壯若婦人灸兩乳中又云爪刺人中良久又針人中

至齒立起此扁鵲法

又方 以繩圍其臂腕男左女右繩從大椎上度下行脊上灸繩頭盡處五十壯活此是扁鵲法

又方 灸其兩脇下取炷中壘如彈丸大數和飲之更以管吹耳中令三四入更五次之

又方 以小管吹鼻孔梁上塵如豆大著中吹之令人

又方 針百會當鼻中入髮際五寸許針入三分補之針足大指甲下肉側去甲三分又針足中指甲上

各三分大指之肉去端韭葉許又針手少陰銳骨之端各一分

又方 灸臍中季肋間二七壯也

肘後推云灸臍中集驗同並出第一卷中

千金論曰風寒之氣客於藏間滯而不能發故瘡不能言及喉痺失聲皆風邪所為也入臟皆能殺人凡

尸厥如死脈動如故此陽脈下墜陰脈上爭氣閉故也療方 灸百會百壯鍼入三分補之



又方 鍼足中指頭去甲如韭葉並刺足大指甲下內側去甲三分

崔氏論曰凡尸厥為病脈動而形無所知陽脈下墜陰脈上爭榮衛不通其狀如死而猶微有息其息不  
常人乃不知欲殯殮者療之方 急可以蘆管吹其兩耳極盡以氣吹之立起若人氣極可易人吹之

中卷

中蠱毒方二十一首

尚德按蠱  
病源作蠱

又按面字  
下病源有  
色字宋本  
同

又按親病  
源作親  
源作野  
源作野

病源凡蠱毒有數種皆是變惑之氣人有故造作之多取蠱蛇之類以器皿盛貯任其自相噉食唯有一  
物獨在者即謂之為蠱使能變惑隨逐酒食為人患禍患禍於他則蠱主吉利所以不羈之徒而畜事之  
又有飛蠱去來無由漸狀如鬼氣者得之卒重凡中蠱病多趨於死以其毒害勢甚故云蠱毒者蠱毒面  
青黃者是蛇蠱其脈洪壯病發之時腹內熱悶胸脇支滿舌本脈強不喜言語身體常痛入心腹如似蟲  
行顏色赤唇口乾燥經年不治肝膈爛而死其面色赤黃者是蛇蠱其脈浮滑而短病發之時腰背微  
滿手腳唇口悉皆青習而喉脈急舌上生瘡二三日不治噉人心肝盡爛下膿血羸瘦顏色枯黑而死其  
面色青白又云其脈沉濡病發之時咽喉塞不欲聞人語腹內鳴喚或上或下天陰雨轉劇皮內如蟲行  
手脚煩熱嗜醋食飲噉膿血顏色白乍青腹內脹滿狀若蝦蟆若成蟲吐出成科斗形是蝦蟆蠱經年  
不治噉人脾胃盡唇口裂而死其脈緩而散者病發之時身體乍冷乍熱手脚煩疼無時節吐逆小便赤  
黃腹內悶胸痛顏色多青毒或吐出似蟻蝦有足翅是蟻蝦蠱經年不治噉人血脈枯盡而死欲知是蠱  
與非當令病人唾水內沈者是蠱浮者非蠱又云旦起取井花水未食前當令病人唾水內唾如柱脚直  
下沉者是蠱毒沉散不至下者草毒又云含大豆若是蠱豆脹皮脫若非蠱豆不爛脫又云以鵠皮置病  
人卧下勿令病人知若病劇者是蠱也又云取新生雞子煮熟去皮留黃白令完全日晚口含以齒微嚙  
勿令破作兩炊時夜吐瓦上著霜露內且看大青是蠱毒也昔有人食新變鯉魚中毒病心腹痛心下發  
發熱煩冤欲得水洗沃身體搖動如魚得水狀有人診云是蠱其家云從無此毒不作蠱治遂死其湯熨



相承四字  
宋本同  
又接病源  
又作又下  
同病作痛

通接病源  
電字下有  
隆字先作

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

又按千金  
有於作皆

鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手著頭相入生地緩舒兩脚以兩手從外抱膝  
中痛低頭入膝間兩手交入頭十二通愈蠱毒及三尸毒腰中大氣又云常度日月星辰清淨以雞鳴安  
身臥漱口三咽之調五臟殺蠱蟲令人長生治心腹病又云治百病邪蠱當正臥閉目閉氣內視丹田以  
鼻徐徐內氣令腹極滿徐徐以口吐之勿令有聲令人多出少以微為故存視五臟各如其形色又存胃  
中令鮮明潔白如素為之倦極汗出乃止以粉粉身摩將形體汗不出而倦者亦可止明日復為之又當  
存作大雷電光走入腹中為之不止病自除  
出第二十卷中  
千金論曰蠱毒千品種種不同或吐下鮮血或好臥闇室不欲見光明或心性反常乍喜或四肢沉  
重百節酸疼如此種種狀貌說不可盡亦有得之三年乃死急者一月或百日即死其死時皆於九孔中  
或於脇下肉中出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蟲猶鬼狐狸老物精魅水不敢  
著人養生之家大須慮此以下亦有灸法初中蠱於心下作艾炷灸一百壯並主猶鬼亦灸得差  
以字下字下有  
捺便大二字  
又論曰世有拙醫見患蠱脹者偏腹腫滿四肢如故小便不甚澀以水病療之近服水藥經五十餘日望  
漸痊愈日復增加奄致殞殞如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失一醫方千卷不盡其理所  
以不可一一備述云爾  
出第二十卷中  
廣濟療蠱毒方服此升麻散三四日後即服前光砂丸方  
升麻 桔梗 桔萸  
出第二十卷中  
右三味搗為散  
以熟湯洗所患人陰中再以濃汁服方寸匕日二服漸加至二匕內消忌粘食猪肉  
肘後療中蠱毒諸方人有養畜蠱毒以病人凡診法中蠱狀令人心腹切痛如有物齧或吐下血不即療  
之食人五臟盡即死矣欲知是蠱與非當令病人唾水沉者是浮者非也  
小品文仲備急集  
驗千金並異同  
又欲知蠱主姓名方 取鼓皮一片燒灰末以飲服病人須更自當呼蠱主姓名可語令知便即去病愈  
矣亦有以蛇涎合作蠱毒著飲食中使人得瘕病此一種積年乃死療之各自有藥江南山間人不可



則便四字

尚德按千金鼓作樓  
舊微作盛  
較

尚德按三  
枝千金作  
一枚

如常法三  
字宋本作  
猶難處生  
生慈冷水  
等九字

一日宋本  
作旦

鵠字下宋  
本有身子

不信之

又方 以襄荷密著病人臥席下亦能令呼蠱主姓名也大仲備急千金並翼同出第三卷中

小品療蠱方 鼓皮廣五寸蠱微根五寸如足鉗指大細切本方云黃若根 右二味以水一升清酒三升煮取一升頓服

之當下蠱即愈千金治蠱吐下血

又方 土瓜根大如梅指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下古今錄驗同

又方 皂莢三挺長一尺者炙去皮子美酒一升漬一宿去滓頓服古今錄驗范汪同時後云以酒五升分三服

又方 取薺危根搗為末以飲服方寸匕古今錄驗同

千金犀角丸療蠱毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫方 犀角末 羚羊角末 鬼臼 桂心各四兩 天雄炮 莽草炙 真珠研 雄黃研 麝香研 貝齒燒灰五兩 射罔如雞子三枚 巴豆五十粒去 右十三味各

搗合篩之以蜜和為丸如小豆大服一丸不知增一丸卒得腹中痛飛尸服如大豆二丸若惡氣腫以

苦酒和以塗之甚良以絳囊盛藥繫男左女右臂辟惡可以備急瘡瘍病也忘如常法范汪同出第二

卷十五

千金翼療蠱毒方 櫟木北陰白皮一大握長五寸以水三升煎取一升空腹服之即吐蠱出也並療蠱

下血出第十卷中

崔氏療蠱方 黃瓜樓根乾者二兩搗以綿裹酒一升漬一日去滓溫服之少時即吐利蠱即出後煮粥

飲服一兩蓋吐利即斷不斷即煮人參甘草炙生薑各一兩服之此根唯山南者好出第三卷中

備急療蠱方 取白鴿毛糞燒灰以飲和服之良

又療蠱方人家雖藏此方而不知如此效驗 搗生栝樓根取汁一升醬汁少許和溫服之須臾吐蠱出

試驗並出第十卷中

必效療蠱毒大神驗方 大戰 桃白皮東引者以斑蝥去足翅大烘之 右三味搗篩為散以冷水服半方寸



尚德按毛  
肘後作貓  
宋本同

名字下米  
本有已蠱  
笋猪肉等  
高德按良  
下二分二  
字疑衍  
如常法宋  
猪肉冷水

尚德按  
病源作雞

尚德按當  
自肘後  
作自當呼

乙一服其毒即出未出更一服蠱並出李饒州法云奇效若以酒中得則以酒服若食中得以飲服之  
崔氏千金同肘後云班毛一分桃皮大戟各二分和棗核大  
米清飲服吐蠱十日不差更一服千金崔氏云服八粒

又方 胡荽根搗取汁半升和酒服之立下

又方 取木鑽相思子二七枚搗碎為末煖水半盞和攪頓服之今蠱即當欲吐抑之勿吐若耐不得即  
大張口吐之其毒即出出訖服稀粥勿食諸肉輕者但服七枚差無問年月深淺非常神效勿輕之

又試蠱法 取銀匙若筋或釵含之經宿色黑即是不黑者非  
出第三卷中

古今錄驗療蠱方 巴豆汁皮去豉半升釜底墨方寸 右三味搗篩為散清且以酒服如髻頭大小行

蠱主當自至門勿應之去到家立自知其姓名

又雄黃丸主蠱毒中藥欲死方 雄黃研硃砂研藜蘆炙馬目毒公 皂莢炙去皺莽草二分 巴豆去熱

各二 右七味搗篩以蜜丸如大豆許服三九當轉下先利清水次出蛇等當煩悶者依常法可用鴨

羹補之忌如常法

又療中蠱毒方 取牡丹根搗末服一錢七日三服至良忌胡荽龍注

又療中蠱胡洽方 以猪膽導下部至良肘後集驗范注同並  
出第四十五卷中

蠱吐血方一十首

病源蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其相啖食餘一存者名為蠱能害人食人腑臟其狀心切痛如

被物啖或鞭面目青黃病變無常是先傷於膈上則吐血也不即治之食臟腑盡則死出第二十卷中

肘後療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方 茜根 蘘荷根各三兩 右二味咬咀以水四升煮取二升去

滓頓服即愈又當自知蠱主姓名備急千金雜論同

又方 巴豆一枚去皮豉三釜底墨方寸 右三味搗分作三九飲下一九須臾當下蠱毒不下更服一九

小品必效集驗文仲備急  
范注同並出第三卷中

蠱吐血方一十首 蠱下血方九首



范汪療中蠱吐血方 麥麴二升熬以水服之令盡當下蠱

又方 苦瓠一枚以水二升煮取一升分服當吐蠱如蝦蟆科斗之類苦瓠毒可臨時量用之附後千金小品大仲

備急古今錄驗同千金云苦瓠一分治下血

又方 生桔梗搗取汁服二三升日三服牛膝根亦得並出第十卷中

文仲療中蠱吐血方 鈐羊皮方三寸敗苦參 蘘荷根兩黃連 當歸略二 右五味切以水七升煎

取二分分三服備急錄驗同

又方 取桑木心剉一斛於釜中以水淹之令上有三寸煮取二斗澄取清又微火煎得五升宿勿食旦

服五合則吐蠱毒崔氏集驗古

又方 雄黃研金月下黃土 獺肝炙各斑貓十四枚去足翅熬 右四味搗末以酪漿服之分為三四服則吐

蝦蟆小品同古今錄驗方有大黃如粟大或吐蝦蟆及蛇等物餘與范注同

崔氏療中蠱吐血方 雄黃研丹砂研藜蘆炙各一兩 右三味搗篩為散旦以井花水服一刀圭當吐蠱毒

忌生血物理肉附錄凡蠱有數種而人養作者最多也郡縣有名章者尤甚今東有句章章安故鄉

南有豫章無村不有無縣不有而不能如此之甚耳非唯其飲食不可噉乃至目色之已入人類此輩

小易療復有自然飛蠱狀如鬼氣者難療此諸種得真犀角麝香雄黃為良藥人可常帶此亦須防之

易有蠱卦又子產所說並以器皿中蠱為蠱今省凡皿上安一虫字或作出邊大非體也並非第

小品療中蠱心痛吐血欲死方 鹽一升瀉苦酒一升煮令稍和一服立吐蠱毒出已用良驗附後文仲備急古今

錄驗同出第四卷中

蠱下血方九首

病源蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其自相食噉餘留一存者為蠱能變化為毒害人有事之以毒

害多因飲食內行之人中之者心腹煩痛煩毒不可忍食人五臟下血瘀黑如爛雞肝出第二十卷中

宋本豫章下有略字入作亦凡作煩

尚應按十金苦瓠一枚寸字下宋本有得字服字下宋本有忌雞肉冷水五字



五字下宋  
本有株字

同前方宋  
本作猪肉  
六字  
尚德按千  
金屑作庫  
一作二

尚德按桃  
根皮下千  
金屑各五  
兩三字

之字下宋  
本有忌猪  
肉冷水等  
物七字

小品療蠱毒腹痛注下赤血踰躅散方 羊躰躅 乾薑 藜蘆 熟附子炮巴豆心熱野葛皮 肉桂

丹砂研雄黃 研蜈蚣一分 右十味搗為散以水服一刀圭不知加一粟米忌猪肉蘆筍生血物生葱

裡肉結吟 錄

又療蠱下血欲死方 舊微根剉一牛膠五 連翹子升臘一 按臘疑當作蠟 尚德 右四味切以水四升煮取

三升分三服即愈古今錄

又療諸蠱大便下血日數十行方 巴豆七 葵蘆 炙附子炮 羌青去足 礬石各二分 右五味搗下篩

別研巴豆如膏和相得以綿裹一大豆許內下部中日二三愈忌同前方千金古今錄同

千金凡忽患下血以上件方療更增劇者此是中蠱其下血狀如鴨肝腹中絞痛急者此方主之 茵根

升麻 肩角各三 地榆 白蘘荷各四 桔梗 黃柏 黃芩各一 右八味切以水九升煮取二升半

分三服

又凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒粗醫以斷痢處之此大非也

又療中蠱毒吐血下血皆如爛雞肝令人心腹絞切痛如有物嚙若不即療令人五臟盡乃死驗之法欲

知是蠱令病人唾水中沉者是蠱浮者非蠱也方 櫟木北陰白皮 桃根皮 蠅皮採一方 亂髮灰方

寸生麻子升五 右五味先煮櫟皮桃根取濃汁一升和麻子汁亂髮灰蠅皮木等令病者少食旦服

一升須臾著盆水以鷄翹攪吐水中如牛涎漬胎及諸蠱毒之物出第二十卷中

千金療翼蠱毒下血方 蠅皮燒灰以水服方寸匕當吐蠱毒出第十卷中 崔氏療中蠱下血及毒下疔羊皮湯方 豕羊皮方三 蘘荷根兩 苦參 黃連各二 當歸 升麻 犀角

略三 右七味切以水九升煮取三升分三服無蘘荷根以茜根代之

又療中蠱毒瀉血日夜腹痛無度不可忍方 取白蘘荷葉四五枚私內著病人眠臥處席下勿令病人

知之若為蠱毒所傷則不肯在上眠即知是蠱毒為病用是葉三挺炙去皮子打碎用極醲醋四升於



變器中候日正午時漬皂莢又以新白布三尺蓋上布上又橫一口食刀正對病人眠牀下安之至來日午時取藥用蓋藥布濾去滓分三服每服相去如人行十里久若不肯服可將鐵刺兩手大姆指端甲亦不勞深其鍼且勿拔出病人當自服藥毒或吐或大便中出除其血即斷腹痛亦除此方用皆驗

並出第三卷中

古今錄驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜下石餘血四藏悉損唯心未毀或乃鼻破待死方 桔梗搗末以酒服方寸匕日三不能下藥以物揭口開灌之心中當煩須臾自靜有項下蠱至服七日止當服猪肝臄以補之

出第四卷中

### 五蠱方一十二首

尚德按又千金作又  
又按千金  
卷作二枚  
作二枚  
作二枚  
後七日

千金太上五蠱方主百蠱吐血傷中心腹結氣或堅氣塞咽喉語聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常狀如鬼祟身體浮腫心悶煩疫寒戰夢與鬼交狐狸作魃卒得心痛上又胸脇痛如刀刺經年累歲著牀不起卷主之方 雄黃 研 椒目 熱巴豆 去心 鬼白 莽草 炙 芫花 煮 真珠 藜蘆 炙 磐石 各四分 獺肝 炙 附子 炮去皮 蜈蚣 三枚 斑蝥 翅足 去 右十三味搗末蜜和更搗一二千杵每服如小豆一丸餘密封勿泄十九為一劑如不中病後日增一丸以下利為度當下蟲種種狀絕不可具載下七日後將息服一劑三十年百病盡除忘五辛猪肉冷水生血物裡肉蘆笋等

又方 酒服桔梗犀角末方寸匕日三服不能自服揭口與藥下心中當煩須臾自靜有項下至七日止當食猪脾以補之

並出第二十五卷中

### 崔氏療五蠱毒方

一曰蛇蠱食中得之咽中如有物噦之不入吐之不出悶亂不得眠心熱不能食方 服馬兜鈴根即吐出又服麝香方寸匕亦自消或吐出也

二曰蛟螭蠱得之胸中忽然或哽入咽怵怵如蟲行欬而有血方 服穠臍脂即下或吐或自消也

尚德按人疑當作人



三曰蝦蟆蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發方 服車脂半升即出  
四曰科斗蠱同上療法甚驗

五曰草蠱術在西涼以西及嶺南人多行此毒入人咽刺痛求死方 服甘草蠱汁即自消

又方 五蠱共一法療之但取產婦胎衣切之暴乾為散水和服半錢匕五毒自消

又方 含升麻蠱汁

又方 五蠱都服馬兜鈴苗似蘿摩草形正直上取雞子大搗為散服半錢匕或至一匕五蠱毒之病多在喉中常煩記之或小醫不識此病言胃冷蛇動或浪稱是注灸刺浪服諸藥枉死也此由醫生未經

歷故也宜令審別之並虫第  
三卷中

古今錄驗五蠱湯方 犀角兩三葉荷根 黃連 絳草 當歸各二羚羊皮各二 右六味切以水七升

煮取二升分為三服服字下宋本有忌  
燒肉冷水五字

又五蠱下利去膏血赤屬九方 芫花升巴豆一百枚 赤屬方圓 右三味搗篩以蜜為丸更搗丸如胡豆

服一九如下利不止以清粥汁止之不下小增之欲令陰除不令大下芫花同並出第四十五卷中  
大下宋本有忌蓋發瘡肉五字

蠱注方三首

病源蠱注者住也言其病遲滯得住死又注易傍人也蠱者是聚蛇蠱之類以器皿盛之令其自相噉食

餘有一箇存者為蠱也而能變化人有造作欽事之者以毒害於他多於飲食內而用用之中者心悶

腹痛其食五臟盡則死有緩有急急者倉卒十數日便死緩者延引歲月遊走腹內常氣力羸癯骨節沉

重發則心腹煩煩而痛令人所食之物亦變化為蠱漸侵食腑臟盡而死死則病流注染者傍人故為蠱

注也出第二  
四卷中

范汪療蠱注百病癥瘕積聚酸削骨肉大小便不利卒忤遇惡風腫脹服滿淋水轉相注彈門盡尸延及

男女外孫醫所不能療更生十七物紫參丸方 紫參 人參 半夏 洗 藜蘆 代赭 桔梗 白薇

外臺必

要

卷二十八

蠱注方三首

蠱毒癰瘡方五首



肉從卷各三石膏 大黃各一牡蠣一分丹參一分蝦蟆反烏頭分四狼毒分附子分五巴豆七心皮去

右藥搗篩蜜和為丸以飲下如小豆一九日三服老小以意減之蜂蠱所螫以塗其上神良忌羊肉冷

水四方無蝦蟆有乾蠱四分出第十四卷中

小品雄黃九療蠱注四肢浮腫肌膚消索欬逆腹大如水狀漏泄死後注易家人方一名蠱脹方 雄黃

研巴豆莽草炙鬼白各四分蜈蚣三枚右五味搗篩為末蜜和更搗三千杵藥成密器封之勿令泄

氣宿勿食服如小豆一九不知加一九當先下清水蠱長數寸及下蛇或如壞雞子或白如膏下訖後

作葱豉粥鴨羹補之忌生魚生菜豬肉蘆笋冷水煖食將養也千金同出

集驗療鬼注蠱注毒氣變化無常鮫魚皮散方 鮫魚皮鰐魚斑犀角麝香研龍骨 丹砂研雄黃研

麝香葉鹿角一分蜈蚣一枚椒汗一分乾薑分貝子枝雞舌香分右十三味搗篩為散空心酒服一

錢錢七日三服出第一

蠱毒雜療方五首

小品瘡蠱似蛇方 雄黃研麝香研 右二味各如大豆許取生羊肺如指大以刀開取雄黃等末以肺

裹吞之崔氏集驗古

又療人食菜及菓子中蛇毒方 大豆末以酒漬取汁半升服之又以雞血和真鐵精吞如梧子大一丸

又療有人食新變魚取飽中毒病心腹痛心下堅發熱煩冤欲得水沃身動搖如魚得水狀有人診病云

是蠱家云野中相承無此毒不作蠱瘡之遂死並出第

千金瘡人得蠱雜蠱方 斑蝥六枚去翅桂心一片如益月下土如彈藜蘆如指 右四味搗篩水服一錢

七下蟲蛇蝦蟆蜈蚣白蠱

又瘡有人中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝變狀無常方 犀角 芍藥各一黃連二兩本一兩梔子

尚德按千金名蟲病

又按按千金作蠱

下疑脫第

本有忘生

血物四字

華本作

三服下末

本有忘生

血物四字

華本作

三服下末

本有忘生

血物四字



字  
尚德按千  
金梳子仁  
七枚發作  
殺以水九  
升煮取三  
升分三服

尚德按耳  
字下千金  
有雜字宋  
本在字  
下  
又按千金  
硃砂二錢  
通按硝粉  
未詳

尚德按病  
源雖作壅  
下同其繩  
下有舊云  
二字並作  
逆復得作

仁救囊荷葉四兩牡丹皮兩羚羊皮方廣五寸右七味切以水五升煮取一升半去滓分溫再服今錄

驗同出第二十五卷中服字下宋本有忌  
猪肉冷水五字又按出字上疑脫並字

古今錄驗療食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常方爐中取鐵精細研別搗烏

雞肝和之丸如梧子大以酒服三九日三服甚者不過十日愈微者便愈附後崔氏同出第四十五卷中

貓鬼野道方三首

病源貓鬼者云是老鼠野物之類變為鬼域而依附於人人畜事之猶如事蠱以毒害人其病狀心腹刺痛食人腑臟吐血痢血而死又野道者是無主之蠱也人有畜事蠱以毒害人為惡既積乃至死滅絕其蠱則無所依止浮遊田野道路之間有犯害人者其病發猶是蠱之狀但以其於田野道路得之故謂之野道並出第二十五卷中

千金療貓鬼野道病歌哭不自由方五月五日取自死赤蛇燒作灰研井花水服方寸匕日一服

又療貓鬼眼見貓狸並耳有所聞方相思子草麻子巴豆各一硃砂未蠟銘四右五味搗作丸

取麻子許含之即以灰圍患人前頭著一斗灰火吐藥火中又按中字下千金有沸字宋本同即畫火上作十字其貓

鬼並皆死矣忌猪肉蘆笋生血物翼方有峭粉出第二十六卷中尚德按水銀粉謂之峭粉

古今錄驗療妖魅貓鬼病人不肯言鬼鹿角散方鹿角屑搗散以水服方寸匕病者即言實也出第四十五卷

自縊死方一十五首

病源人有不得意志者多生忿恨往往自縊以繩物繫頸自懸挂致死呼為自縊若覺早雖已死徐徐抱下其陰陽經絡雖暴擁閉而臟腑真氣故有未盡所以猶可救療故有得活者若見其懸挂便忽遽截斷其繩則不可救此言氣已擁閉繩忽暴斷其氣雖通而奔並運悶氣則不能遂即不復得生又云自縊死且至暮雖已冷必可活暮至旦則難療此謂其盡則陽盛其氣易通也夜則陰盛其氣難通也又云夏則



得復

宋本髮字  
下有發字  
之字作發  
耳二字

尚德按微  
要略作數  
又按極疑  
皆作強  
又按乃要  
皆作吸  
通按微耗  
音羣按纖  
者毛或席  
者

夜短又熱則易活又云氣雖已斷而心微溫一日以上猶可活也

出第二十三卷中

肘後葛氏療自縊死心下尚微溫久猶可活方 徐徐抱解其繩不得斷之懸其髮令足去地五寸許塞

兩鼻孔以蘆管內其口中至咽令人噓之有項其腹中驚驚轉或是通氣也其舉手榜人當益堅捉持

更逆噓之若活了能語乃可置若不得懸髮可中分髮兩手牽之

又方 是焚末葱葉吹其兩鼻孔中逆出復內之

並出第三卷中

仲景云自縊死旦至暮雖已冷必可療暮至旦小難也恐此當言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶

應可療又云心下若微溫者一日以上猶可活徐徐抱解不得截繩上下安被臥之一人以腳踏其兩

肩手小挽其髮常弦勿縱之一人以手按據胸上微動之一人摩捋臂脰屈伸之若已僵但漸漸強屈

之並按其腹如此一炊頃氣從口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿若勞之須令可少桂心湯及粥清含

與之令濡喉漸漸能嚥乃稍止兼令兩人各以管吹其兩耳彌好此最善無不活者並皆療之

錄驗 備急方 以屬衣若氈氈厚氈物覆其口鼻抑之令兩人極力吹其兩耳一炊頃可活也

又方 懸牽其頭髮塞兩耳勿令通氣以葱葉刺鼻中兩人極力痛吹之嚙其兩腳踵即活亦可塞鼻而

吹口活也

小品古今錄驗同

范汪療自縊死方 懸其髮令足裁至地一時許即活

又方 急手掩其口鼻勿令內氣稍出二時許氣至即活

備急文仲古今錄驗同

又方 以絹急絞身體令堅以車牛載行三十里許使人於車上行踏肩引髮吹耳

又方 以松子油內口中令得入咽中則便活



尚德按身  
千金作其

尚德按  
病源作變

千金療自縊死方 以藍青汁灌之又極須安定身心徐徐緩解慎勿割繩抱取心下猶溫者刺雞冠血

滴口中即活男用雌雞女用雄雞

又方 雞屎白以棗許酒半盞和灌口鼻中即活

又方 梁上塵如大豆各內一筒中四人各一筒同時吹鼻中兩耳極力吹之即活

又方 尿鼻口眼耳中並捉頭髮一撮如筆管大擊之立活

並出第二十六卷中

刪繁療五絕死方 一曰自縊二曰牆壁所近三曰溺水四曰魘魘五曰產乳皆取半夏一兩擣篩吹一

大豆內鼻孔中即活心下溫一日者亦可活

千金同

### 熱喝方七首

病源夏月炎熱人多冒涉途路熱毒入內與五臟相並客邪熾盛鬱於不宣致陰氣卒絕陽氣暴擁經絡不通故奄然悶絕謂之喝也然此乃外邪所擊真藏未壞若遇便療救氣宣則蘇也夫熱喝不可得冷得冷便死此謂外邪卒以冷觸其熱蘊積於內不得宣發故也又冒熱困乏候人盛暑之時觸冒大熱熱毒之氣入藏則悶鬱冒至於困乏也

並出第二十三卷中

肘後夏月中熱喝死凡中喝死不可使得冷得冷便死療之方 以屈草帶繞喝人臍使三四人尿其中

令溫亦可用泥土屈草亦可加瓦椀底若脫車缸以著喝人臍上取令尿不得流去而已此謂道路窮

急無湯當令人尿其中仲景云欲使多人尿取令溫若有湯便可與之仲景云不用泥及車缸恐此物

冷喝既在夏月得熱土泥暖車缸亦可用也

備急大仲景同小品千金同

又方 灸兩乳頭各七壯

千金同

又方 取道中熱塵土以積喝人心下多為佳少冷即易通氣也

千金同

又方 擣薑蒲汁飲之一二升

又凡此療自經溺喝之法並出自張仲景為之其意理殊絕殆非常情所及亦非本草之所能開悟實極



外臺祕要

卷二十八

熱厥方上

卷二十八

十一

救人之大術矣傷寒家別復有喝病在上仲景論中非此遇熱之喝文仲同出第七卷中

千金瘰癧喝方

可飲熱湯亦可

其土佳

驗今錄

文仲瘰癧月喝死方

濃煮麥汁灌三升不差更灌之

附後千金同

古今錄驗瘰癧喝方

令人口虛心前令暖易人為之

附後同

溺死方九首

病源人為水所投溺死孔竅入灌注肺腑其氣擁閉故死早拯救得出即泄瀉其水令氣血得通便得

活又云經半日及一日猶可瘰癧氣若已絕心下暖者亦可活

出第二十卷中

肘後瘰癧溺死一宿者尚可活方

以皂莢末綿裹內下部中須臾出水則活

驗今錄

又方 倒懸解衣挑去臍中垢極吹兩耳即活

集驗千金小品文仲附急同

又方 倒懸死人以好酒灌鼻中立活

古今錄驗同

又方 取甕傾之以死者伏甕上令口臨甕口燃以燼火二七把燒甕中當死人心下令煙出小入死者

鼻口中鼻口中水出盡則活盧盡更益為之取活而止常以手候死人身及甕勿令其熱久天常令火

氣能使死人心下得暖若卒無甕可就岸穿地令如甕燒之令暖乃以死人著上亦可用車轂為之當

勿隱其腹及令得低頭使水出并熱灰數斛以粉身濕即易

附金

小品瘰癧溺死若身尚暖者方

取甕中灰兩石餘以埋人從頭至足水出七孔即活

附後同

又方 便脫取暖釜覆之取溺人伏上腹中出水便活也

附後同並出第十卷中

千金瘰癧落水死方

以甕中灰布地令厚五寸以甕側著灰上合死人於甕上使頭小垂下炒鹽二方寸

已內管中吹下孔中即當吐水水下因去甕以死人著灰中攪身使出鼻口即活矣

又方 掘地作坑中熱灰數斛內坑中下死人覆灰濕微即易之勿令灰熱路膊人冷即易之半日即活

尚能按投  
病源作沒  
宋本同  
入按病源  
攪作瘰下  
作上



又按千金無  
烙字宋本同

備急療溺死方

屈死人兩脚著人肩以上以死人背向生人背負持走吐出水便活

附後云亦治凍死  
金附後文仲集驗小

品古今錄驗同  
出第八卷中

凍死方一首

病源人有在途路逢淒風苦雨繁霜大雪衣服霑濡令氣入藏致令陰氣開於內陽氣絕於外榮衛結澀不復流通故致噤絕而死若早得救療血溫氣通則生又云凍死一日猶可活過此即不療

出第二十卷中

肘後療冬天墮水凍四肢直口禁裁有微氣出方

以大器中多熬灰使煖囊盛以薄其心上冷即易心

煖氣通目則得轉口乃開可溫尿溺清稍含之即活若不先溫其心便持火炙其身冷氣與火相搏

則死

集驗備急文仲  
金古今錄驗同

八井塚悶方二首

肘後云此事他方少有其說且人為之寡不俟別條今於水凍之後附此乃是地氣薰蒸蓋亦障霧之例

服諸解毒犀角雄黃麝香之屬豉豆竹瀝并麻諸湯亦應為佳

出第三卷中

小品療八井塚悶冒方

凡五月六月井中及深塚中皆有伏氣入中令人鬱悶殺人如其必須入中者

先以雞鴨雞鳥毛投之直下至底則無伏氣毛若桺柳不下則有毒氣也亦可內生六畜等置中若有毒其物即死必須入不得已當先以酒若無以苦酒數升先灑井塚中四邊畔停少時然後可入若覺

中有些氣鬱悶奄奄欲死者遂取其中水灑人面令飲之又以灌其頭及身體即活若無水取他水用

也

附後千金錄驗  
出第十卷中

千金療八井塚毒氣方

取他井中水灑身上至三食頃便活若東井取西井南井取北井中水用之

出

卷中


高德按障  
疑當作毒

高德按千  
金華作藥  
金華作藥  
金華作藥











W 2467 W

1915

V. 26-28